

為保護環境，本產品未附說明書。

請妥善保管此藥盒，服用前務必詳閱藥盒說明。

【使用上的注意事項】**禁止事項** (若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外。)
1. 下列的人請勿服用。(1)曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。(2)未滿 15 歲的兒童。(3)接受過下列診斷的人。肝臟病 **2. 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。**其他抗過敏藥物 (包括皮膚疾病用藥及鼻炎用內服藥等)、含有抗組織胺劑的內服藥等 (如感冒藥、鎮咳祛痰藥、暈車藥、催眠鎮靜藥等) **3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。**(可能出現嗜睡等。)
4. 正在哺乳的人請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳。 **5. 服用前後，請勿飲酒。**

諮詢事項 **1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者**(1)正在接受醫師治療的人。(2)孕婦或可能懷孕的人。(3)年長者。(4)曾因藥品等，引發過敏症狀的人。(5)症狀原因不明，無法判斷是因過敏反應或其他原因所致的人。(6)曾接受過支氣管氣喘、異位性皮膚炎等其他過敏性疾病診斷的人。(7)目前使用含 10 mg 鹽酸依匹斯汀藥品，欲改用本藥的人。 **2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此藥盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。**皮膚：發疹、發紅、腫脹、發癢 消化器官：噁心、嘔吐、口腔炎、胃部不適感、腹痛、胃部沉重感、胃脹感、腹部膨滿感、食欲不振 精神神經系統：頭暈、失眠、頭痛、頭昏腦脹、麻痺感、惡夢、幻覺、幻聽 呼吸器官：呼吸困難 循環器官：心悸 泌尿器官：排尿困難、頻尿、血尿、蛋白尿 其他：浮腫、潮紅、胸痛、喉嚨有痰、倦怠感、鼻塞、月經異常、口中苦味、味覺減退、女性化乳房 (指男性胸部隆起狀似女性)、乳房變大 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。 肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸 (皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。 血小板減少：因血液中的成分——血小板的數量減少，出現流鼻血、牙齦出血、瘀青等出血症狀。 **3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此藥盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。**口乾、便秘、腹瀉、嗜睡 **4. 即使服用 1 週左右 (包含服用其他含有鹽酸依匹斯汀成分醫藥品的時間)，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此藥盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。** **5. 即使症狀有所改善，若需服用超過 2 週 (包含服用其他含有鹽酸依匹斯汀成分醫藥品的時間) 時，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。**

【用法·用量】 成人 (15 歲以上) 每日 1 次，每次 1 錠，於睡前以水或溫水服用。

〈用法·用量相關的注意事項〉(1)未滿 15 歲請勿服用。(2)請嚴守用法·用量。(3)用於花粉等季節性過敏性鼻炎症狀時，建議自花粉飛散預測日或症狀初現時儘早開始服用，效果較佳。(4)錠劑取出方式：如右圖所示，以指尖用力按壓

裝有錠劑之 PTP 鋁箔包裝凸起部分，使背面鋁箔破裂後取出服用。
(若誤將鋁箔包裝直接吞下，可能會導致刺傷食道黏膜等意外事故。)



(PTP 鋁箔包裝取出圖)

【保管及使用上的注意事項】(1)請存放於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。(2)請保管於兒童拿不到的地方。(3)請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或品質變質。)(4)超過使用期限請勿服用。