

【請將本說明與本藥劑一同保管・服用藥劑時請務必詳閱。】

銷售名稱：S.TAC EX NEO

S.TAC[®] EX NEO

第②類醫藥品

【感冒藥】針對症狀劇烈的「喉嚨痛、流鼻水、發燒、咳嗽」

<產品特點>

- 針對嚴重不適的感冒。含有布洛芬 600 mg，為 S.TAC 史上最大配合量（1 日劑量）。
- 更採用獨家技術，促使布洛芬快速溶解並加速吸收。
- 布洛芬可緩和喉嚨痛並具備退燒作用。配合對鼻部症狀有效的碘化異丙腎胺與馬來酸氯苯那敏。鹽酸氨溴索可促進導致咳嗽的痰液排出，並與磷酸二氫可待因共同鎮咳。
- 採用便於攜帶的 PTP 包裝。



使用上的注意事項



禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外。）

● 下列的人請勿服用

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
- (2) 曾服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥，引發氣喘的人。
- (3) 未滿 15 歲的兒童。
- (4) 預產期 12 週內的孕婦。
- (5) 正在醫療機構接受下列疾病治療或藥物投與的人。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、血液疾病、肝臟病、腎臟病、心臟病、高血壓、正在服用齊多夫定(Retrovir)的人

● 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品

其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥、催眠鎮靜藥等）、胃腸鎮痛鎮痙藥

● 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類

（可能出現嗜睡、視力模糊和異常日眩等症狀。）

● 正在哺乳的人請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

● 服用前後，請勿飲酒

● 請勿服用超過 5 天



諮詢事項

● 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
- (2) 孕婦或可能懷孕的人。
- (3) 年長者。
- (4) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
- (5) 有下列症狀的人。發高燒、排尿困難
- (6) 接受過下列診斷的人。 甲狀腺功能障礙、糖尿病、青光眼、全身性紅斑性狼瘡、混合性結締組織病、支氣管氣喘、呼吸功能障礙、阻塞性睡眠呼吸中止症候群、肥胖症
- (7) 曾罹患下列疾病的人。 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、克隆氏症、血液疾病、肝臟病、腎臟病

● 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹・發紅・發癢
消化器官	噁心・嘔吐、食欲不振、胃部不適感、胃痛、口腔炎、胸口灼熱、胃脹、胃腸出血、腹痛、腹瀉、胃部或腹部膨滿感
精神神經系統	頭暈、失眠、心情鬱悶、頭痛
循環器官	心悸
呼吸器官	氣短
泌尿器官	排尿困難
其他	視力模糊、耳鳴、浮腫、麻痺感、背部疼痛、過度的體溫低下、臉部潮紅、異常目眩

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
皮膚黏膜眼症候群(史蒂芬強生症候群)、中毒性表皮壞死溶解症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅等持續，或者突然惡化。

(接正面)

症狀名稱	症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。
無菌性腦膜炎	出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐等。（尤其是接受全身性紅斑性狼瘡或混合性結締組織病治療的人當中，許多人自訴這種症狀。）
心肌梗塞	如被壓迫般的胸痛、呼吸困難、冒冷汗。
腦血管障礙	突然出現意識降低或消失、單側手足難以活動、頭痛、嘔吐、頭暈、說話困難、言語表達困難等症狀。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。
血液疾病	出現喉嚨痛、發燒、全身倦怠、臉部或眼臉內側發白、容易出血（牙齦出血、鼻血等）、出現瘀青（按壓後顏色不消失）等。
消化道疾病	出現糞便變黑、吐血、血便、黏液血便（混有血液、黏液、膿的軟便）等。
呼吸抑制	出現氣短、呼吸困難等。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
便秘、口乾、嗜睡

●即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下（特別是發燒持續 3 日以上或反覆發燒時），請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

療效・效果

緩和感冒的各項症狀（喉嚨痛、發燒、流鼻水、鼻塞、咳嗽、生痰、打噴嚏、惡寒、頭痛、關節痛、肌肉疼痛）

用法・用量

每日 3 次，請依下列 1 次劑量，儘量於飯後 30 分鐘內以水或溫水服用。

年齡	成人（15 歲以上）	未滿 15 歲
1 次劑量	2 錠	✗ 請勿服用

〈用法・用量相關的注意事項〉

- (1)請嚴守用法・用量。
- (2)錠劑取出方式：如右圖所示，以指尖用力按壓裝有錠劑的 PTP 鋁箔包裝凸起部分，使背面鋁箔破裂後取出服用。（若誤將鋁箔包裝直接吞下，可能會導致刺傷食道黏膜等意外事故。）



成分

每 6 錠
(1 日劑量) 中

布洛芬	600 mg
碘化異丙腎上腺素	6 mg
馬來酸氯苯那敏	7.5 mg
鹽酸氨溴索	45 mg
磷酸二氫可待因	24 mg
dI-鹽酸甲基麻黃鹼	60 mg
氧化鎂	300 mg
無水咖啡因	75 mg

添加物：無水二氧化矽、纖維素、乳糖、羥丙基纖維素、羥丙基甲基纖維素、交聯聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、D-甘露醇、硬脂酸鎂、滑石粉、氧化鈦、玉米澱粉、聚乙烯醇、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯共聚物

保管及使用上的注意事項

- (1)請存放於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
- (2)請保管於兒童拿不到的地方。
- (3)請勿換裝於其他容器。（可能導致誤用或品質變質。）
- (4)超過使用期限請勿服用。

諮詢聯絡窗口

請諮詢原購買店舖或客戶諮詢室。
SS 製藥株式會社 客戶諮詢室 電話 0120-028-193
受理時間：9 時至 17 時 30 分（不含週六、日及國定假日）

製造銷售商



SS 製藥株式會社

〒163-1488 東京都新宿區西新宿 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>