

服用される前に
必ずお読みください。

アレルギー用薬

アレジオン[®]20

第2類医薬品



Eisai 製薬

1 このお薬の効果は？

アレジオン20は、アレルギーの原因となる物質（ヒスタミン）や炎症を起こす物質の作用を抑え、アレルギー症状を改善するアレルギー性鼻炎のお薬です。

症状がアレルギーによるものか、風邪などによるものかわからない人は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：
鼻みず、鼻づまり、くしゃみ

2 このお薬を使う前に、確認すべきことは？

次の項目にひとつでも該当する方は、このお薬を服用することはできません。

- ☐ 過去に本剤に含まれる成分（エピナスチン塩酸塩）で過敏な反応を経験したことがある人。
- ☐ 授乳中の人。（どうしても服用する場合は、授乳を避けてください。）
- ☐ 15才未満の小児。
- ☐ 肝臓病の診断を受けた人。

次の項目にひとつでも該当する方は、このお薬を服用する際に注意が必要です。
購入される前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- ☐ 医師の治療を受けている人。
- ☐ 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ☐ 高齢者。
- ☐ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ☐ アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
- ☐ 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。
- ☐ エピナスチン塩酸塩を10mg含有する医薬品から本剤に変更しようとしている人。

3 このお薬の使い方は？

成人（15才以上）1回1錠を1日1回、就寝前に服用してください。

〔服用方法は？〕

コップ1杯程度の水又はぬるま湯で服用してください。

〔服用し忘れた場合は？〕

飲み忘れた場合は、服用間隔を24時間程度あければ就寝前でなくても服用可能です。

〔誤って多く服用した時（過量服用）の対応は？〕

用法・用量を厳守してください。誤って過量服用した場合、もし異常を感じたら、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4 このお薬の服用中に気をつけなければならないことは？

- ・医師の治療を受けている人や薬局・薬店で他のお薬を購入する場合は、このお薬を服用していることを必ず医師、薬剤師又は登録販売者に告げてください。
- ・このお薬を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）
- ・眠気等があらわれることがあるので、服用後は乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
- ・このお薬を服用する前後は飲酒しないでください。
- ・1週間間服用（他のエピナスチン塩酸塩を含有する医薬品の服用期間を含む）しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・症状の改善が見られても2週間（他のエピナスチン塩酸塩を含有する医薬品の服用期間を含む）を超えて服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
[初めて24錠入りの製品をお求めの方は、症状の改善が見られても2週間（他のエピナスチン塩酸塩を含有する医薬品の服用期間を含む）を超えて服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。]

5 副作用は？

- ・服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感、腹痛、胃重感、胃もたれ感、腹部膨満感、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、頭痛、頭がぼーっとする、しびれ感、悪夢、幻覚、幻聴
呼吸器	息苦しい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難、頻尿、血尿、蛋白尿
その他	むくみ、ほてり、胸痛、痰がからむ、倦怠感、鼻づまり、月経異常、苦味を感じる、味覚が弱くなる、女性化乳房（男性に見られる女性のような乳房）、乳房が大きくなる

- ・服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢、眠気
- ・まれに起きる重篤な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重篤な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、直ちに医師の診療を受けてください。

重篤な副作用	主な自覚症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。

以上の自覚症状を、副作用があらわれる部位別に並びかえると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重篤な副作用ごとの表を確認してください。

部 位	自覚症状	部 位	自覚症状
全身	発熱、からだのだるい	腹部	食欲不振
眼	白目が黄色くなる	皮膚	皮膚が黄色くなる、かゆみ、発疹、青あざができる
口	歯ぐきからの出血	尿	尿が褐色になる
		その他	出血しやすい、鼻血

6 このお薬に含まれているのは？

1錠(1日量)中 エピナスチン塩酸塩 20mg
 添加物：無水ケイ酸、乳糖、ヒプロメロース、ポビドン、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、マクロゴール、シリコーン樹脂、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン

7 その他

- ・直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。

服用にあたっては、パッケージ内の説明を必ずお読みください

このお薬についてのお問い合わせ先は？

この説明書でわからないことや、このお薬を服用してから変わった症状があらわれるなど、お気づきの点がございましたら、お買い求めのお店、又は下記までご連絡ください。

[お問い合わせ先] エスエス製薬株式会社 〒163-1488 東京都新宿区西新宿3-20-2
 お客様相談室 電話0120-028-193 受付時間9:00～17:30(土、日、祝日を除く)