

下划线部分：2024 年 10 月修订

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

EVE QUICK®头痛药

第②类医药品

解热镇痛药 布洛芬复方制剂

- EVE QUICK 头痛药是一款专为切实缓解头痛而设计的制剂。其以布洛芬为主要成分，此外还添加了用于提高其镇痛效果的烯丙基异丙基乙酰胺、无水咖啡因，以及在保护胃黏膜的同时加速布洛芬吸收的氧化镁。

《特点》

- 独家配方将促进镇痛成分的吸收，从而可快速作用于头痛根源，发挥优异疗效。
● 含有温和不伤胃的胃黏膜保护成分。

⚠ 使用注意事项



禁止事项

(如不遵守，容易导致现有症状恶化，
或发生不良反应、事故。)

❶ 以下人群请勿服用

- (1) 曾因本品或本品成分而出现过敏症状者。
(2) 曾因服用本品或其他解热镇痛药、感冒药而引起哮喘者。
(3) 不满 15 岁的儿童。
(4) 预产期在 12 周以内的孕妇。

❷ 服用本品期间，请勿服用以下任一药品

其他解热镇痛药、感冒药、镇静药、晕车药

❸ 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类

(可能会出现困意等。)

❹ 服用前后请勿饮酒

❺ 请勿长期连用



咨询事项

❶ 以下人群请在服用前咨询医生、牙科医生、药剂师或注册销售者

- (1) 正在接受医生或牙科医生治疗者。
(2) 孕妇或可能妊娠的妇女。(3) 哺乳期妇女。
(4) 老年人。(5) 曾因药物等而出现过敏症状者。
(6) 接受过以下诊断者。心脏病、肾脏疾病、肝病、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病
(7) 曾患有以下疾病者。胃/十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、克罗恩病

❷ 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、牙科医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒、出现淤青
消化系统	作呕感/呕吐、食欲不振、胃部不适、胃痛、口腔黏膜炎、胃灼热、胃沉重、胃肠出血、腹痛、腹泻、便中带血
精神神经系统	头晕
循环系统	心悸
呼吸系统	呼吸短促
其他	视物模糊、耳鸣、浮肿、鼻血、牙龈出血、出血难止、出血、背痛、体温过度降低、身体乏力

偶尔可能出现以下严重症状。这种情况下，请立即就医。

症状名称	症状
休克 (速发严重过敏反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识混浊等。
皮肤黏膜眼综合征(史蒂文斯-约翰逊综合征)、中毒性表皮坏死松懈症	持续出现高热、眼睛充血、眼分泌物、嘴唇溃烂、喉咙痛、皮肤大面积皮疹/发红等症状，或症状急剧恶化。

(承正面)

症状名称	症状
肝功能损害	出现发热、发痒、皮疹、黄疸（皮肤和眼白发黄）、褐色尿、全身乏力、食欲不振等。
肾脏疾病	出现发热、皮疹、尿量减少、全身浮肿、全身乏力、关节痛、腹泻等。
无菌性脑膜炎	出现伴有脖颈僵硬的剧烈头痛、发热、作呕感/呕吐等症状。（这类症状尤其多见于接受系统性红斑狼疮或混合性结缔组织病治疗的人群中。）
心肌梗死	胸被勒紧般的疼痛、呼吸困难、出冷汗。
脑血管障碍	突然意识降低/丧失、一侧肢体活动困难、头痛、呕吐、头晕、说话困难、无法讲话等。
哮喘	呼吸时发出“咻咻”、“咻咻”的声音，出现呼吸困难等。
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发热、皮肤或黏膜苍白、疲劳、心悸、呼吸短促、感到恶心和头晕、血尿等。
粒细胞缺乏症	突发高热、发冷、喉咙痛等。

- 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者
便秘、困意
- 如果服用 5~6 次后症状仍未改善，请中止服用，并持本说明书咨询医生、牙科医生、药剂师或注册销售者

适应证

- 头痛、肩酸痛、牙疼、月经疼痛（痛经）、嗓子痛、关节痛、肌痛、神经痛、腰痛、拔牙后的疼痛・挫伤疼痛、耳痛、骨折疼痛、扭伤疼痛、外伤疼痛的镇痛
- 寒战、发热时解热

用法用量

请按照以下单次剂量，1 日最多服用 3 次，用水或温水送服，尽量避免空腹服用。服用至少间隔 4 小时。

年龄	成人（年满 15 岁）	不满 15 岁
单次剂量	2 片	× 禁止服用

〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 片剂的取出方法 如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的 PTP 药板凸起部，压破背面的铝箔，取出后服用。
（如不慎直接将其吞服，会导致食管黏膜刺穿等意外事故。）



成分

布洛芬 150mg 烯丙基异丙基乙酰脲 60mg
氧化镁 100mg 无水咖啡因 80mg

2 片中

辅料： 无水硅酸、纤维素、羟丙基纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、硬脂酸镁、滑石粉、二氧化钛

储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿服用过期产品。

咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。
SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193
受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商



SS 制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>