

00007742

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。

本文件仅作为参考信息,请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管,务必在服用前仔细阅读。】

**DREWELL®**

第②类药品

睡眠改善药 缓解暂时性失眠引起的以下症状 难以入睡、睡眠浅

● 用于此类情况或此类人群的暂时性失眠

- 压力大, 睡不着
- 明明很累, 神经却亢奋无法入睡
- 因心怀忧虑而半夜觉醒
- 不规律的生活导致睡眠节奏紊乱, 无法入睡

睡前服用 DREWELL 对缓解难以入睡、睡眠浅等暂时性失眠症状有效。



● DREWELL 的有效成分

DREWELL 的有效成分(盐酸苯海拉明)广泛用于舒缓皮肤瘙痒或抑制打喷嚏和流鼻涕等过敏症状, 但服用后会产生困意。DREWELL 是一种利用盐酸苯海拉明所具有的产生困意的作用而制成的药物。

● DREWELL 助眠机制

在与大脑的睡眠和觉醒密切相关的下丘脑后部, 存有许多被称为兴奋性神经元的组胺能神经元。从这些末梢释放的组胺通过使大脑皮质等大脑各个部位的神经细胞产生兴奋来维持和调节觉醒状态。DREWELL 的有效成分(盐酸苯海拉明)可抑制大脑中组胺的作用, 从而产生助眠作用。



## ⚠ 使用注意事项



### 禁止事项

(如不遵守, 容易导致现有症状恶化, 或发生不良反应、事故。)

● 以下人群请勿服用

- (1) 孕妇或可能妊娠的妇女。
- (2) 不满 15 岁的儿童。
- (3) 经常性失眠者。
- (4) 被诊断为失眠者。

● 服用本品期间, 请勿使用以下任一药品

其他催眠镇静药、感冒药、解热镇痛药、镇咳祛痰药、含抗组胺药的口服药等(鼻炎口服药、晕车药、抗过敏药等)

● 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类

(可能会导致困意, 从而引起事故。此外, 若服用本品后至第二天仍持续犯困或感到疲倦, 则请勿驾驶交通工具或操作机械类, 直到这些症状消失。)

● 哺乳期妇女请勿服用本品, 或者服用本品时, 请避免哺乳

● 服用前后请勿饮酒

● 请仅在难以入睡或睡眠浅的时候服用本品, 切勿连用。



### 咨询事项

● 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者

- (1) 正在接受医生治疗者。
- (2) 老年人。(老年人可能会出现困意加剧或相反的神经亢奋等症状。)
- (3) 曾因药物等而出现过敏症状者。
- (4) 有以下症状者。排尿困难
- (5) 接受过以下诊断者。青光眼、前列腺增生



(接背面)

®: 注册商标

(承正面)

- 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
消化系统	胃痛、作呕感/呕吐、食欲不振
精神神经系统	头晕、头痛、起床时头沉重感、白天的困意、情绪不佳、神经紧张不安、暂时性意识混乱（注意力降低、类迷糊症状、判断障碍、言语与行为异常等）
循环系统	心悸
泌尿系统	排尿困难
其他	倦怠感

- 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

口干、腹泻

- 如果服用2~3次后症状仍未改善，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

## 其他注意事项

可能会到第二天仍持续犯困或感到疲倦。

### 适应证

缓解暂时性失眠引起的以下症状：难以入睡、睡眠浅

### 用法用量

难以入睡时或睡眠浅时，请按照以下单次剂量，1日1次，睡前用水或温水送服。

年龄	成人（年满15岁）	不满15岁
单次剂量	2片	×禁止服用

### 〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 如果1次服用超过2片，可能会出现神经亢奋等不适症状，反而导致失眠。
- (3) 请仅在睡前服用，其他时段禁用。
- (4) 片剂的取出方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的PTP药板凸起部，压破背面的铝箔，取出后服用。（如不慎直接将其吞服，会导致食管黏膜刺穿等意外事故。）



(PTP药板取出示意图)

### 成分

盐酸苯海拉明 ..... 50mg

2片中

辅料：交联羧甲纤维素钠、无水硅酸、纤维素、乳糖、羟丙基纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、硬脂酸镁、滑石粉、二氧化钛

### 储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿服用过期产品。

### 咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间：9:00～17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商



SS 制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>