



【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】



S. TAC® VITA FORCE

第②类医药品

【感冒药】

<产品特点>

- S. TAC VITA FORCE 是一款含有维生素 C、维生素 B₁ 的综合感冒药，能够有效缓解感冒的 11 种症状。
- 缓解喉咙痛、咳嗽、流鼻涕、发烧等各种令人难受的感冒症状。
- 采用便于携带的 PTP 包装。



使用注意事项



禁止事项

（如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生不良反应、事故。）

❶ 以下人群请勿服用

- (1) 曾因本品或本品成分而出现过敏症状者。
- (2) 曾因服用本品或其他感冒药、解热镇痛药而引起哮喘者。
- (3) 不满 15 岁的儿童。
- (4) 预产期在 12 周以内的孕妇。

❷ 服用本品期间，请勿使用以下任一药品

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺药的口服药等（鼻炎口服药、晕车药、抗过敏药、催眠镇静药等）

❸ 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类

（可能会出现困意等。）

❹ 哺乳期妇女请勿服用本品，或者服用本品时，请避免哺乳

❺ 服用前后请勿饮酒

❻ 禁止过量服用或连续服用超过 5 日



咨询事项

❶ 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者

- (1) 正在接受医生或牙科医生治疗者。
- (2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
- (3) 老年人。
- (4) 曾因药物等而出现过敏症状者。
- (5) 有以下症状者。 高热、排尿困难
- (6) 接受过以下诊断者。 甲状腺功能障碍、糖尿病、心脏病、高血压、肝病、肾病、青光眼、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症
- (7) 曾患有以下疾病者。
胃/十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、克罗恩病

❷ 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒、出现淤青
消化系统	作呕感/呕吐、食欲不振、胃部不适、胃痛、口腔黏膜炎、胃灼热、胃沉重、胃肠出血、腹痛、腹泻、便中带血
精神神经系统	头晕
循环系统	心悸
呼吸系统	呼吸短促
泌尿系统	排尿困难
其他	视物模糊、耳鸣、浮肿、鼻血、牙龈出血、出血难止、出血、背痛、体温过度降低、身体乏力

偶尔可能出现以下严重症状。这种情况下，请立即就医。

症状名称	症状
休克 (速发严重过敏反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识混浊等。
皮肤黏膜眼综合征（史蒂文斯-约翰逊综合征）、中毒性表皮坏死松解症	持续出现高热、眼睛充血、眼分泌物、嘴唇溃烂、喉咙痛、皮肤大面积皮疹/发红等症状，或症状急剧恶化。
肝功能损害	出现发热、发痒、皮疹、黄疸（皮肤和眼白发黄）、褐色尿、全身乏力、食欲不振等。

®：注册商标

(接背面)

(承正面)

症状名称	症状
肾脏疾病	出现发热、皮疹、尿量减少、全身浮肿、全身乏力、关节痛、腹泻等。
无菌性脑膜炎	出现伴有颈部僵硬的剧烈头痛、发热、作呕感/呕吐等症状。（这类症状尤其多见于接受系统性红斑狼疮或混合性结缔组织病治疗的人群中。）
心肌梗死	胸被勒紧般的疼痛、呼吸困难、出冷汗。
脑血管障碍	突然意识降低/丧失、一侧肢体活动困难、头痛、呕吐、头晕、说话困难、无法讲话等。
间质性肺炎	出现爬楼梯或稍微劳累时的呼吸短促/呼吸困难、干咳、发热等，而且这些症状会突然出现或持续。
哮喘	呼吸时发出“咝咝”、“咻咻”的声音，出现呼吸困难等。
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发热、皮肤或黏膜苍白、疲劳、心悸、呼吸短促、感到恶心和头晕、血尿等。
粒细胞缺乏症	突发高热、发冷、喉咙痛等。
呼吸抑制	出现呼吸短促、呼吸困难等。

- 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者
便秘、口干、困意
- 如果服用 5~6 次后症状仍未改善（尤其是发热持续 3 日或以上，或者反复发热时），请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

适应证

缓解各种感冒症状（喉咙痛、咳嗽、流鼻涕、发烧、寒战、鼻塞、打喷嚏、头痛、痰液、关节痛、肌痛）

用法用量

请按照以下单次剂量，1 日 3 次，餐后（尽量在 30 分钟内）用水或温水送服。

年龄	成人（年满 15 岁）	不满 15 岁
单次剂量	 3 片	✗ 禁止服用

〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 药片取出方法 如右图所示，用指尖用力按压装有药片的 PTP 包装凸起部分，刺破背面的铝箔后取出药片服用。（如果误将铝箔包装直接吞服，可能会导致包装刺入食道黏膜等意外事故。）



成分

9 片（日剂量）
中

布洛芬 ····· 450mg
磷酸双氢可待因 ····· 24mg
dℓ-盐酸甲基麻黄碱 ····· 60mg
马来酸氯苯那敏 ····· 7.5mg

无水咖啡因	75mg
硝酸硫胺（维生素 B ₁ 硝酸盐）	24mg
抗坏血酸（维生素 C）	300mg

辅料： 无水硅酸、纤维素、乳糖、蔗糖、羟丙基纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、碳酸钙、巴西棕榈蜡、硬脂酸镁、滑石粉、二氧化钛、部分预胶化淀粉、普鲁兰、聚氧乙烯聚氧丙烯二醇

储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿服用过期产品。

咨询方式	请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。 SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193 受理时间：9:00～17:00（周六、周日、节假日除外）
--------------------	--

生产销售商

50



SS 制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>