

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。
本説明書僅供産品資訊參考，正確內容請以產品所附的原始說明書為準。

【請將本說明書與本藥劑一同保管，服用藥劑時請務必詳閱。】

HYTHIOL WHITEA PREMIUM®

第 3 類醫藥品

維生素 C 主藥製劑 針對黑斑、雀斑

HYTHIOL WHITEA PREMIUM 的特點：

- L-半胱氨酸、維生素 B₆、維生素 C 從身體內部對肌膚發揮作用，緩和雀斑、雀斑等色素沉澱。
 - 抑制肌膚深層過剩黑色素的生成。
 - 抑制過剩黑色素的沉積。
 - 幫助肌膚代謝，促進黑色素順暢排出。
 - 淡化已沉澱於肌膚的黑色素顏色。
- 小顆錠狀設計，讓不擅長吞服錠劑者也容易服用。

⚠ 使用上的注意事項



諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	噁心、嘔吐



- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 即使服用 1 個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

療效・效果

1. 緩和下列各項症狀：黑斑、雀斑、日曬或斑疹引起的色素沉澱
2. 預防下列情況的出血：牙齦出血、鼻血
「但關於上述 1 及 2 之症狀，即使使用 1 個月左右也不見改善的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或牙科醫師。」
3. 補給下列情況下的維生素 C：身體疲勞時、懷孕、哺乳期、病中病後的體力低下時、老年期

®：註冊商標

用法・用量 每日 2 次，請依下列 1 次劑量，以水或溫水服用。

年齡	成人 (15 歲以上)	7 歲 ~ 14 歲	未滿 7 歲
1 次劑量	2 錠	1 錠	✕ 請勿服用

〈用法・用量相關的注意事項〉

- (1)請嚴守用法・用量。
- (2)無論飯前或飯後，隨時均可服用。
- (3)使兒童服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。

成分

每 4 錠 (成人 1 日劑量) 中	L-半胱氨酸.....	240 mg
	抗壞血酸 (維生素 C)	500 mg
	鹽酸吡哆醇 (維生素 B ₆)	50 mg

添加物：無水二氧化矽、纖維素、羥丙基纖維素、聚乙烯醇・丙烯酸・甲基丙烯酸甲酯共聚物、D-甘露醇、矽酸鋁鉀、二甲基聚矽氧烷、二氧化矽、硬脂酸鈣、滑石粉、氧化鈦、玉米澱粉、酒石酸

- 服用本藥劑可能會影響尿液及糞便的檢驗值。接受醫師檢查時，請告知醫師正在服用維生素 C。

保管及使用上的注意事項

- (1)請存放於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
- (2)請保管於兒童拿不到的地方。
- (3)請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或品質變質。)
- (4)請將瓶蓋確實關緊。如未確實關緊，可能因受潮等而變質。
此外，請勿以濕手拿取本藥劑。
- (5)瓶中的填充物是為了防止錠劑在運輸過程中受損。
開啟後即不再需要，請將其丟棄。
- (6)超過使用期限請勿服用。



諮詢聯絡窗口

請諮詢原購買店鋪或客戶諮詢室。

SS 製藥株式會社 客戶諮詢室 電話 0120-028-193

受理時間：9 時至 17 時 30 分 (不含週六、日及國定假日)

10



製造銷售商

SS 製藥株式會社

〒163-1488 東京都新宿區西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>

MAT-JP-2602808-1.0-05/2026

19010