

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。
本文件仅作为参考信息，请务必阅读随产品附带的文件

下划线部分：2021年1月修订

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

ESTARON MOCHA®12

第3类医药品

醒脑药 缓解困意和乏力

- 当工作或学习时因“困倦”和“乏力”而难以提高效率。那么，再加把劲..... ESTARON MOCHA 12 作为一款提神药在这种情况下非常有效。
- 3~4杯咖啡量的咖啡因（1次量中）会作用于大脑皮层，消除困倦。
- 维生素 B₁、B₆、B₁₂ 与咖啡因一起发挥作用，消除倦怠感（乏力）。
- 采用的是便于携带的 PTP 包装。

在这些情况下.....



会议



深夜加班



备考学习

⚠ 使用注意事项



禁止事项

（ 如不遵守，容易导致现有症状恶化，
或发生不良反应。 ）

① 以下人群请勿服用

- (1) 有以下症状者。胃酸过多
- (2) 接受过以下诊断者。心脏病、胃溃疡

② 服用本品期间，请勿服用以下药品

其他醒脑药

③ 请勿与含咖啡因的饮品同时服用，例如咖啡或茶

④ 本品仅可短期服用，切勿连用



咨询事项

① 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者

- (1) 正在接受医生治疗者。
- (2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
- (3) 哺乳期妇女。

② 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者



相关部位	症状
皮肤	皮疹
消化系统	食欲不振、作呕感/呕吐
精神神经系统	颤抖、头晕、焦虑、失眠、头痛
循环系统	心悸

®：注册商标

适应证

消除睡意（困倦）和倦怠感

用法用量

请按照以下单次剂量服用，1日最多服用2次。
服用至少间隔6小时。

年龄	成人（年满15岁）	不满15岁
单次剂量	2片	×禁止服用

〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 切勿在6小时内连续服用。
(嚼起来有苦味。)
- (3) 请用水或温水送服，无需咀嚼。
(嚼起来有苦味。)

(4) 片剂的取出方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的PTP药板凸起部，压破背面的铝箔，取出后服用。

(如不慎直接将其吞服，会导致食管黏膜刺穿等意外事故。)



(PTP药板取出示意图)

成分

2片中

无水咖啡因	200mg
硝酸硫胺（维生素B ₁ 硝酸盐）	5mg
盐酸吡哆醇（维生素B ₆ ）	5mg
氰钴胺（维生素B ₁₂ ）	7.5 μg

辅料：羧甲基纤维素钠、交联羧甲基纤维素钠、纤维素、乳糖、羟丙基纤维素、羟丙甲纤维素、聚维酮、聚乙二醇、乙基纤维素、脂肪酸甘油酯、硬脂酸镁、滑石粉、二氧化钛、没食子酸丙酯、焦糖

储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿服用过期产品。



咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商



SS制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>

01

00008563