

【請將本說明書與本藥劑一同保管，服用藥劑時請務必詳閱。】

ANERON「NYSCAPS」

第②類醫藥品

暈車藥

- ANERON「NYSCAPS」膠囊對於預防與緩和因搭乘交通工具引起的噁心、暈眩、頭痛等症狀具有優異效果。
- 含有 5 種有效成分。每日 1 次，每次 1 粒即可見效的持續性製劑。
- 無論飯前或飯後均可服用。出現暈車症狀後服用亦有效。
- 直接作用於胃部，預防並緩和噁心感。
- 為預防暈車暈船，請於乘車或乘船前 30 分鐘服用。

⚠ 使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外。)

❶ 下列的人請勿服用

未滿 15 歲的兒童。

❷ 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品

其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有抗組織胺劑的內服藥等 (鼻炎用內服藥、過敏用藥等)

❸ 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類

(可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。)



諮詢事項

❶ 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師治療的人。
- (2) 孕婦或可能懷孕的人。
- (3) 年長者。
- (4) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
- (5) 有下列症狀的人。 排尿困難
- (6) 接受過下列診斷的人。 青光眼、心臟病



❷ 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
精神神經系統	頭痛
循環器官	心悸
泌尿器官	排尿困難
其他	臉部潮紅、異常目眩

❸ 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

口乾、便秘、腹瀉、嗜睡、視力模糊

療效・效果

預防及緩和因暈車而產生的頭暈、噁心、頭痛

用法・用量

每日 1 次，請依下列 1 次劑量，以水或溫水服用。另，為預防暈車時，請於搭乘交通工具前 30 分鐘服用。

年齡	成人 (15 歲以上)	未滿 15 歲
1 次劑量	1 粒	✕ 請勿服用

〈用法・用量相關的注意事項〉

- (1)請嚴守用法・用量。
- (2)無論飯前或飯後均可服用。

成分

每 1 粒中

馬來酸苯那敏.....	30 mg
氨基苯甲酸乙酯.....	50 mg
氫溴酸東莨菪鹼水合物.....	0.2 mg
無水咖啡因.....	20 mg
鹽酸吡哆醇 (維生素 B ₆).....	5 mg

添加物：二氧化矽、明膠、纖維素、白糖、羥丙基纖維素、乙基纖維素、甘油脂肪酸酯、滑石粉、玉米澱粉、甲基丙烯酸共聚物 L、月桂基硫酸鈉、沒食子酸丙酯、維生素 B₂、紅色 3 號、黃色 5 號、青色 1 號

給易暈車者的建議

- 搭乘巴士、船、飛機等交通工具的前一晚，請注意避免睡眠不足。
- 適量進食易消化的食物，調整好腸胃狀態。
- 盡量坐在搖晃較少的位置，放鬆姿勢並舒適地乘坐。
- 眺望窗外遠處的風景，或透過聊天、遊戲等方式分散注意力。
- 預先服用暈車藥會更有效。

保管及使用上的注意事項

- (1)請存放於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
- (2)請保管於兒童拿不到的地方。
- (3)請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或品質變質。)
- (4)超過使用期限請勿服用。

諮詢聯絡窗口

請諮詢原購買店鋪或客戶諮詢室。

SS 製藥株式會社 客戶諮詢室 電話 0120-028-193

受理時間：9 時至 17 時 30 分 (不含週六、日及國定假日)

製造銷售商

SS 製藥株式會社

〒163-1488 東京都新宿區西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>

