

■イブシリーズ 成分比較表

製品名	イブスリーショットプレミアム			イブクイック頭痛薬DX		
カテゴリ（薬効）	解熱鎮痛薬			解熱鎮痛薬		
分類	第②類医薬品			第②類医薬品		
パッケージ	<p>つらい頭痛・生理痛・肩こり痛に。</p> 			<p>つらい頭痛に速攻※！</p>  <p>※速攻：早めに対処すること</p>		
剤形	錠剤			錠剤		
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> 頭痛・月経痛（生理痛）・肩こり痛・歯痛・咽喉痛（のどの痛み）・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざにとまなう痛み（ねんざ痛）・外傷痛の鎮痛 悪寒（発熱によるさむけ）・発熱時の解熱 			<ul style="list-style-type: none"> 頭痛・肩こり痛・歯痛・月経痛（生理痛）・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 悪寒・発熱時の解熱 		
用法・用量	次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。			次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。		
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	3錠	×服用しないこと	1回量	2錠	×服用しないこと
成分	成分 3錠中			成分 2錠中		
	イブプロフェン		195mg	イブプロフェン		200mg
	酸化マグネシウム		70mg	酸化マグネシウム		100mg
	アセトアミノフェン		195mg	アリルイソプロピルアセチル尿素		60mg
	無水カフェイン		65mg	無水カフェイン		80mg
	添加物：無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、クロスボビドン、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン			添加物：無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、クロスボビドン、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、ラウリル硫酸Na		

製品名	イブクイック頭痛薬			イブA錠		
カテゴリ（薬効）	解熱鎮痛薬			解熱鎮痛薬		
分類	第②類医薬品			第②類医薬品		
パッケージ	<p>頭痛に速攻※！</p>  <p>※速攻：早めに対処すること</p>			<p>さまざまな痛み（肩こり痛・頭痛など）に</p> 		
剤形	錠剤			錠剤		
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> 頭痛・肩こり痛・歯痛・月経痛（生理痛）・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 悪寒・発熱時の解熱 			<ul style="list-style-type: none"> 月経痛（生理痛）・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 悪寒・発熱時の解熱 		
用法・用量	次の1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。			次の1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。		
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	2錠	×服用しないこと	1回量	2錠	×服用しないこと
成分	成分 2錠中			成分 2錠中		
	イブプロフェン		150mg	イブプロフェン		150mg
	酸化マグネシウム		100mg	アリルイソプロピルアセチル尿素		60mg
	アリルイソプロピルアセチル尿素		60mg	無水カフェイン		80mg
	無水カフェイン		80mg			
	添加物：無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン			添加物：クロスカルメロースNa、無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン		

製品名	イブA錠EX	
カテゴリ（薬効）	解熱鎮痛薬	
分類	第②類医薬品	
パッケージ	<p>生理痛によく効く</p> 	
剤形	錠剤	
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ● 月経痛（生理痛）・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 ● 悪寒・発熱時の解熱 	
用法・用量	次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。	
	年齢	成人(15才以上) 15才未満
	1回量	2錠 ×服用しないこと
成分	成分 2錠中	
	イブプロフェン	200mg
	アシルイソプロピルアセチル尿素	60mg
	無水カフェイン	80mg
	添加物：無水ケイ酸、セルロース、クロスカルメロースNa、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン	

※成分は全て1回量を記載しています。