

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。

本文件仅作为参考信息，请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

# SURULAC®MAGNESIUM

第3类医药品

## 非刺激性便秘药

- SURULAC MAGNESIUM 是一款非刺激性便秘药，不会刺激肠道，故不易引起腹痛或形成依赖。
- 在氧化镁的作用下，水分集聚在肠道内使粪便软化，从而促进顺畅排便。
- 对于初次使用便秘药的人也同样推荐。

## ⚠ 使用注意事项

**⊗ 禁止事项**（如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生不良反应。）

- ① 服用本品期间，请勿服用以下药品  
其他导泻剂（泻药）

**👨 咨询事项**

- ① 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者

- (1) 正在接受医生治疗者。
- (2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
- (3) 老年人。
- (4) 有以下症状者。剧烈腹痛、作呕感/呕吐
- (5) 接受过以下诊断者。肾脏疾病



- ② 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
消化系统	剧烈腹痛、作呕感/呕吐
精神神经系统	极度困倦、意识模糊
循环系统	站起时头晕、脉率减慢
呼吸系统	呼吸困难
其他	肌无力、口干

- ③ 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

腹泻

- ④ 如果服用1周左右症状仍未改善，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

## 适应证

- 便秘
- 缓解便秘伴有的以下症状：腹胀、皮肤粗糙、痘痘、肠内异常发酵、食欲不振（食欲减退）、痔疮、头沉重、头部充血

## 用法用量

请按照以下单次剂量，1日1次，睡前（或空腹时）用水或温水送服。  
但首次请使用最小剂量，并根据排便情况和状态逐渐增加或减少剂量。

年龄	成人（年满15岁）	11岁~14岁	7岁~10岁	5岁~6岁	不满5岁
单次剂量	3~6片	2~4片	2~3片	1~2片	×禁止服用

● 空腹的参考服用时间：尽可能在餐后2小时或以上

### 〈用法用量相关注意事项〉

#### 树脂容器装产品、PTP药板装产品通用的事项


- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 让儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- (3) 请将本品含于口中，用1杯（约180ml）水或温水送服。

#### 关于PTP药板装产品的事项

##### 片剂的取出方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的PTP药板凸起部，压破背面的铝箔，取出后服用。

（如不慎直接将其吞服，会导致食管黏膜刺穿等意外事故。）



## 成分及作用

成分	6片中	作用
氧化镁	2000mg	水分集聚在肠道内使粪便软化，从而促进顺畅排便。

辅料：纤维素、羧甲纤维素钙、硬脂酸钙、*l*-薄荷醇

## 储存及处理注意事项

#### 树脂容器装产品、PTP药板装产品通用的事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿服用过期产品。

#### 关于树脂容器装产品的事项

- (1) 请盖紧容器盖。如果未盖紧，可能会因受潮等而变质。此外，请勿用湿手拿取本品。
- (2) 容器内的填充物是为了防止药片在运输过程中损坏。开封后便不再需要，请将其取出。



## 咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193  
受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商

 **SS制药株式会社**

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>