

〔使用注意事项〕**禁止事项**（如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生不良反应。）1. 以下人群请勿服用（1）胃酸过多者。（2）被诊断为心脏病、胃溃疡者。2. 服用本品期间，请勿服用以下药品 其他醒脑药 3. 请勿与含咖啡因的饮品同时服用，例如咖啡或茶。4. 本品仅可短期服用，切勿连用

咨询事项 1. 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者（1）正在接受医生治疗者。（2）孕妇或可能妊娠的妇女。（3）哺乳期妇女。2. 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本药瓶咨询医生、药剂师或注册销售者。

消化系统：食欲不振、作呕感/呕吐

精神神经系统：颤抖、头晕、焦虑、失眠、头痛

循环系统：心悸

〔适应证〕 消除睡意（困倦）和倦怠感
〔用法用量〕 成人（年满 15 岁）1 次 1 瓶（30ml），
1 日服用 1 次。

〈用法用量相关注意事项〉

- （1）不满 15 岁者禁止服用。
- （2）请严格遵守用法用量。
- （3）切勿 1 日服用 2 次或以上。

〔成分〕 1 瓶（30ml）中

咖啡因水合物 150mg、盐酸硫酸素 10mg、盐酸吡哆醇 5mg、
甘油磷酸钙 20mg、烟酰胺 15mg、牛磺酸 1,000mg

辅料： D-山梨醇、蔗糖、乙醇、丙二醇、枸橼酸、苯甲酸钠、对羟基苯甲酸酯、乙基香兰素、焦糖、L-谷氨酸钠、香兰素、香料

〔储存及处理注意事项〕

- （1）请存放在阴凉处，避免阳光直射。
- （2）请存放在儿童无法触及的地方。
- （3）请勿服用过期产品。

使用期限

生产编号



不良反应损害救济制度
电话 0120-149-931

30mL

缓解困倦和乏力的药品

咖啡味提神药

ESTARON MOCHA® 口服液

第 3 类医药品

销售商  SS 制药株式会社
东京都新宿区西新宿 3-20-2
客户咨询室 电话 0120-028-193
受理时间 9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）
<https://www.ssp.co.jp/>

生产销售商 同仁医药化工株式会社
福岛县福岛市濑上町东中川原 8-1