

NEW HUSTENON®

第②类医药品

镇咳祛痰药 适用于咳嗽/痰液 含有祛痰成分 L-羧甲司坦

- NEW HUSTENON 通过镇咳成分、促进粘附在喉咙中的痰液排出的成分、缓解呼吸困难的成分等发挥作用，对伴有痰液的咳嗽具有优异疗效。

⚠ 使用注意事项

⊗ 禁止事项 (如不遵守，容易导致现有症状恶化，) 或发生不良反应、事故。

❶ 以下人群请勿服用

- (1) 曾因本品或本品成分而出现过敏症状者。
- (2) 不满 12 岁的儿童。

❷ 服用本品期间，请勿使用以下任一药品

其他镇咳祛痰药、感冒药、镇静药、含抗组胺药的口服药等（鼻炎口服药、晕车药、抗过敏药、催眠镇静药等）

❸ 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类

(可能会出现困意等。)

❹ 哺乳期妇女请勿服用本品，或者服用本品时，请避免哺乳

❺ 请勿过量服用或长期连用



咨询事项

❶ 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者

- (1) 正在接受医生治疗者。(2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
- (3) 老年人。(4) 曾因药物等而出现过敏症状者。
- (5) 有以下症状者。高热、排尿困难
- (6) 接受过以下诊断者。心脏病、高血压、糖尿病、青光眼、肝病、甲状腺功能障碍、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症

❷ 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
消化系统	腹痛、作呕感/呕吐、食欲不振
精神神经系统	头晕
泌尿系统	排尿困难

偶尔可能出现以下严重症状。这种情况下，请立即就医。

症状名称	症状
休克 (速发严重过敏反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识混浊等。
皮肤黏膜眼综合征(史蒂文斯-约翰逊综合征)、中毒性表皮坏死松解症	持续出现高热、眼睛充血、眼分泌物、嘴唇溃烂、喉咙痛、皮肤大面积皮疹/发红等症状，或症状急剧恶化。
肝功能损害	出现发热、发痒、皮疹、黄疸(皮肤和眼白发黄)、褐色尿、全身乏力、食欲不振等。
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发热、皮肤或黏膜苍白、疲劳、心悸、呼吸短促、感到恶心和头晕、血尿等。
粒细胞缺乏症	突发高热、发冷、喉咙痛等。
呼吸抑制	出现呼吸短促、呼吸困难等。

(承正面)

③ 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

便秘、口干、困意、腹泻

④ 如果服用 5~6 次后症状仍未改善，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

适应证

咳嗽、痰液

用法用量

请按照以下单次剂量，1 日 3 次，餐后用水或温水送服。

年龄	成人（年满 15 岁）	12 岁~14 岁	不满 12 岁
单次剂量	4 片	2 片	×禁止服用

〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 让儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分及作用

成分	12 片中	作用
L-羧甲司坦	750mg	稀释粘附在喉咙中的粘稠痰液，同时修复受损的呼吸道黏膜，促进痰液排出。
磷酸双氢可待因	30mg	作用于咳嗽中枢，抑制咳嗽的发生。
dℓ-盐酸甲基麻黄碱	75mg	缓解支气管肌紧张，解除呼吸困难，同时镇咳。
马来酸氯苯那敏	12mg	缓解过敏性咳嗽。

辅料：羧甲基纤维素钙、无水硅酸、纤维素、乳糖、蔗糖、羟丙基纤维素、羟丙甲纤维素、聚维酮、碳酸钙、巴西棕榈蜡、硬脂酸镁、滑石粉、二氧化钛、普鲁兰、聚氧乙烯聚氧丙烯二醇

治疗咳嗽、痰液时……

- 除服用本品外，还应注意以下事项。
- 保证充足的营养和睡眠，努力恢复体力。
 - 避免室内空气干燥。
 - 避免吸烟，并通过漱口等方式保护喉咙。

储存及处理注意事项

- (1) 请盖紧瓶盖，存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿湿手拿取本品。湿手拿取可能会导致糖衣不均匀或变色。
- (5) 瓶内填充物是为了防止药片在运输过程中损坏。开封后便不再需要，请将其取出。
- (6) 请勿服用过期产品。



咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商



SS 制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>

91

00008224