

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。

本説明書僅供產品資訊參考，正確內容請以產品所附的原始說明書為準。

【請將本說明書與本藥劑一同保管，服用藥劑時請務必詳閱。】

# HYTHIOL®C PLUS EX

第 3 類醫藥品

L-半胱氨酸製劑 配合幫助代謝的胺基酸「L-半胱氨酸」

何謂 L-半胱氨酸……

它是構成蛋白質的胺基酸之一。大量存在於皮膚與肝臟中，透過參與各種代謝，對身體健康發揮重要的作用。

HYTHIOL-C PLUS EX 是透過幫助身體代謝的胺基酸「L-半胱氨酸」，從身體內部作用於細胞，治療黑斑、雀斑的醫藥品。

## ●從身體內部治療黑斑、雀斑。

L-半胱氨酸可幫助肌膚細胞更新恢復正常，並與維生素 C 產生相乘效果，促進排出導致黑斑、雀斑原因的過剩黑色素。

## ●針對黑斑、雀斑，每日 2 次持續服用，效果較佳。

肌膚更新週期約為 42 天。由於新的肌膚生成至表層需要時間，因此持續服用較為有效。HYTHIOL-C PLUS EX 將能逐步改善黑斑、雀斑。

## ●對全身倦怠（疲勞、倦怠）、宿醉也能發揮效果。

L-半胱氨酸作用於肝臟，幫助身體代謝（產生能量），改善疲勞與倦怠。

此外，它能與酒精代謝產生的乙醛直接反應並使其無毒化，並幫助酵素將酒精轉化為無害物質，對宿醉也能發揮效果。

## ⚠ 使用上的注意事項



### 諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	噁心・嘔吐、腹痛



- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
腹瀉
- 即使服用一陣子，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

**療效・效果**

- 黑斑、雀斑、日曬等的色素沉澱症
- 全身倦怠
- 宿醉
- 青春痘、濕疹、蕁麻疹、斑疹、藥疹

**用法・用量**

每日 2 次，請依下列 1 次劑量，以水或溫水服用。

年齡	成人 ( 15 歲以上 )	7 歲 ~ 14 歲	未滿 7 歲
1 次劑量	2 錠	1 錠	✕ 請勿服用

**〈用法・用量相關的注意事項〉**

- (1) 請嚴守用法・用量。
- (2) 無論飯前或飯後，隨時均可服用。
- (3) 使兒童服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。

**成分**

每 4 錠  
( 成人 1 日劑量 ) 中


L-半胱氨酸 .....	240 mg
抗壞血酸 ( 維生素 C ) .....	500 mg
泛酸鈣 .....	30 mg

添加物：無水二氧化矽、纖維素、乳酸鈣、羥丙基甲基纖維素、羥丙基纖維素、聚乙二醇、硬脂酸鈣、滑石粉、氧化鈦、玉米澱粉、酒石酸、二甲基聚矽氧烷、二氧化矽、聚乙二醇・丙烯酸・甲基丙烯酸甲酯共聚物

- 服用本藥劑可能會影響尿液及糞便的檢驗值。接受醫師檢查時，請告知醫師正在服用維生素 C。

**保管及使用上的注意事項**

- (1) 請存放於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。( 可能導致誤用或品質變質。 )
- (4) 請將瓶蓋確實關緊。如未確實關緊，可能因受潮等而變質。此外，請勿以濕手拿取本藥劑。
- (5) 瓶中的填充物是為了防止錠劑在運輸過程中受損。開啟後即不再需要，請將其丟棄。
- (6) 超過使用期限請勿服用。

**諮詢聯絡窗口**

請諮詢原購買店鋪或客戶諮詢室。

SS 製藥株式會社 客戶諮詢室 電話 0120-028-193

受理時間：9 時至 17 時 30 分 ( 不含週六、日及國定假日 )

製造銷售商



**SS 製藥株式會社**

〒163-1488 東京都新宿區西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>

