



批号 日期
987300 060063

不良反应报告办公室 电话 010-149-931

打喷嚏

缓解花粉、鼻炎 (室内灰尘) 等引起的下列鼻部过敏症状: 流鼻涕、鼻塞、

眼泪、清鼻涕、打喷嚏、流鼻涕、玉米淀粉

辅料: 丙酸甲羟孕酮、聚维酮、丙烯酸乙酯-甲基丙烯酸甲酯共聚物、聚乙二醇、硅树脂、硬脂酸、20mg

成分

*本公司已获批的非处方鼻炎药中/特效性 鼻腔减充血剂 20mg

持效性(盐酸依匹斯汀) 最大量配伍*

第二代抗组胺成分

※服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类。

不易犯困*



24 小时有效



1 日 1 次

及早妥善对抗鼻炎

产品特点

注意

Alesion® 20

24 日量

1 日 1 次 24 小时有效

不易犯困*

含盐酸依匹斯汀

Alesion® 20

首次使用 Alesion 20 的人士建议先购买 6 片装或 12 片装的产品。

24 片
24 日量

及早妥善对抗鼻炎

1 日 1 次 24 小时有效

过敏专用鼻炎药

Alesion®

20 最大量配伍*

持效性 盐酸依匹斯汀 20mg *本公司已获批的非处方鼻炎药中

不易犯困*

含盐酸依匹斯汀

第 2 类医药品

适用于流鼻涕、鼻塞、打喷嚏

SS 制药

客户咨询室
电话 010-028-193
受理时间 9:00~17:00
(周六、周日、节假日除外)
<https://www.ssp.co.jp/>

如用于花粉等季节性过敏性鼻炎症
状, 从花粉飞散预测日期开始, 或
在症状初现后尽早开始服用效果较
好。

生产销售商
SS 制药株式会社
东京都新宿区西新宿 3-20-2

务必从这里打开
请阅读包装盒内侧的说明

开口



产品
信息



为保护环境，未附说明书。

请妥善保管本包装盒，并务必在服用前阅读包装盒上的说明。

【使用注意事项】 禁止事项（如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生不良反应、事故。）

1. 以下人群请勿服用。（1）曾因本品或本品成分而出现过敏症状者。（2）不满 15 岁的儿童。（3）接受过以下诊断者。肝病 2. 服用本品期间，请勿使用以下任一药品。其他抗过敏药（包括皮肤病用药、鼻炎口服药）、含抗组胺药的口服药等（感冒药、镇咳祛痰药、晕车药、催眠镇静药等）3. 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类。（可能会出现困意等。）4. 哺乳期妇女请勿服用本品，或者服用时请避免哺乳。 5. 服用前后请勿饮酒。

咨询事项 1. 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者。（1）正在接受医生治疗者。

（2）孕妇或可能妊娠的妇女。（3）老年人。（4）曾因药物等而出现过敏症状者。（5）不明确症状是由过敏引起还是由其他原因引起者。（6）曾被诊断为支气管哮喘、特应性皮炎等其他过敏性疾病者。（7）计划将含有 10mg 盐酸依匹斯汀的药品变更为本品者。 2. 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或注册销售者。皮肤：皮疹/发红、肿胀、发痒 消化系统：作呕感/呕吐、口腔黏膜炎、胃部不适、腹痛、胃沉重、胃胀感、腹胀、食欲不振 精神神经系统：头晕、失眠、头痛、头昏脑胀、麻木、梦魇、幻觉、幻听 呼吸系统：呼吸困难 循环系统：心悸 泌尿系统：排尿困难、尿频、血尿症、蛋白尿 其他：浮肿、潮热、胸痛、痰堵、倦怠感、鼻塞、月经不调、感觉口苦、味觉减退、男性乳腺发育（男性出现类似女性的乳房）、乳房增大 偶尔可能会出现以下严重症状。这种情况下，请立即就医。 肝功能疾病：出现发热、发痒、皮疹、黄疸（皮肤和眼白发黄）、褐色尿、全身疲倦、食欲不振等。 血小板减少：血液中的成分血小板数量减少，导致出现鼻血、牙龈出血、淤青等出血症状。 3. 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或注册销售者。口干、便秘、腹泻、困意 4. 如果服用 1 周左右（包括服用其他含盐酸依匹斯汀的药品的时间）症状仍未改善，请中止服用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或注册销售者。 5. 即使症状有所改善，但如果服用超过 2 周（包括服用其他含盐酸依匹斯汀的药品的时间），请咨询医生、药剂师或注册销售者。

【用法用量】 成人（年满 15 岁）1 次 1 片，1 日 1 次，睡前用水或温水送服。

〈用法用量相关注意事项〉 （1）不满 15 岁请勿服用。（2）请严格遵守用法用量。（3）如用于花粉等季节性过敏性鼻炎症状，从花粉飞散预测日期开始，或在症状初现后尽早开始服用效果较好。

（4）片剂的取出方法 如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的 PTP 药板凸起部，压破背面的铝箔，取出后服用。（如不慎直接将其吞服，会导致食管黏膜刺穿等意外事故。）

【储存及处理注意事项】 （1）请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。

（2）请存放在儿童无法触及的地方。（3）请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）

（4）请勿服用过期产品。



(PTP 药板取出示意图)