

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。  
本文件仅作为参考信息，请务必阅读随产品附带的文件

请将本说明书与本品一同保管，务必在使用前仔细阅读。

MEMO<sup>®</sup>A

第 2 类医药品

## 外伤用软膏

- MEMO A 是一种质地柔滑、易于涂抹的软膏，含有杀菌剂、可缓解伤口疼痛的局部麻醉剂和促进伤口愈合的成分等。
- 其有效成分对割伤、擦伤、烧伤等具有优异的疗效。
- 可以作为家庭常备药品，也可以作为运动或旅行时的随身药品使用。

## 使用注意事项

### 禁止事项

（ 如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生不良反应。 ）

#### ① 以下人群请勿使用

曾因本品或本品成分、氯己定而出现过敏症状者。



### 咨询事项

#### ① 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者

- (1) 正在接受医生治疗者。
- (2) 曾因药物等而出现过敏症状者。
- (3) 患处面积较大者。
- (4) 深度创伤或严重烧伤者。

#### ② 使用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒

偶尔可能出现以下严重症状。

这种情况下，请立即就医。

症状名称	症状
休克 (速发严重过敏反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识混浊等。

#### ③ 如果使用 5~6 日后症状仍未改善，请中止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

®：注册商标

## 适应证

- 割伤、擦伤、刺伤、抓伤、脚磨伤
- 轻度烧伤
- 伤口表面的杀菌/消毒

## 用法用量

1日数次，取适量涂抹于患处。

### 〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 让儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
- (2) 谨防入眼。万一不慎入眼，请立即用水或温水清洗。如果症状严重，请至眼科就诊。
- (3) 仅限外用。

## 成分

1g 中

葡萄糖酸氯己定溶液	10mg
盐酸辛可卡因	3mg
尿囊素	10mg
生育酚乙酸酯 (维生素 E 醋酸酯)	1mg
氧化锌	50mg

辅料：石蜡、凡士林、白蜂蜡、三油酸山梨坦、苯酚、麝香草酚、香料

## 关于割伤、擦伤、轻度烧伤的治疗……

即便是轻微的割伤、擦伤等或是轻度烧伤，尽快处理也很重要。请在注意以下事项的基础上进行处理。

- 如果伤口上沾有沙子或碎石等，请用自来水等冲洗干净，晾干，然后涂抹 MEMO A。
- 如果被烧伤，请立即将患处浸入冷水中冷却，然后涂抹 MEMO A。
- 在伤口愈合之前，请用创可贴或纱布等保护患处。
- 请勿强行剥离伤口上形成的痂皮。

## 储存及处理注意事项

- (1) 请盖上瓶盖，存放在阴凉处，避免阳光直射。如果盖子拧得太紧，可能会难以打开。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿使用过期产品。

### 咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193  
受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商

 **SS 制药株式会社**

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2  
<https://www.ssp.co.jp/>

91

7-0A0