

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。  
本文件仅作为参考信息，请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

# SS BRON®液 L

第2类医药品

镇咳祛痰药 适用于咳嗽/痰液

- 剧烈咳嗽不仅令人烦恼，还会影响睡眠，消耗体力。  
此外，喉咙里有痰也会让人感到非常不适。
- SS BRON 液 L 是一款对咳嗽和痰液具有良好效果且易于吞咽的糖浆剂，含有镇咳成分和促进痰液排出成分等。

## ⚠ 使用注意事项



### 禁止事项

( 如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生不良反应、事故。 )

#### ① 以下人群请勿服用

曾因本品或本品成分而出现过敏症状者。

#### ② 服用本品期间，请勿服用以下任一药品

其他镇咳祛痰药、感冒药、镇静药、含抗组胺药的口服药等（鼻炎口服药、晕车药、抗过敏药、催眠镇静药等）

#### ③ 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类

（可能会出现困意等。）



### 咨询事项

#### ① 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者

- (1) 正在接受医生治疗者。
- (2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
- (3) 曾因药物等而出现过敏症状者。
- (4) 有以下症状者。 高热、排尿困难
- (5) 接受过以下诊断者。青光眼



#### ② 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
消化系统	作呕感/呕吐、食欲不振
精神神经系统	头晕
呼吸系统	呼吸困难、呼吸短促
泌尿系统	排尿困难

偶尔可能出现以下严重症状。这种情况下，请立即就医。

症状名称	症状
休克 (速发严重过敏反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识混浊等。
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发热、皮肤或黏膜苍白、疲劳、心悸、呼吸短促、感到恶心和头晕、血尿等。
粒细胞缺乏症	突发高热、发冷、喉咙痛等。

#### ③ 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

口干、困意

#### ④ 如果服用 5~6 次后症状仍未改善，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

## 适应证

咳嗽、痰液

## 用法用量

请按照以下单次剂量，用附带的刻度量杯量取，1日3次，均于餐后服用。另外，视情况可每4小时服用一次，每日最多6次。

年龄	成人 (年满15岁)	11岁~14岁	8岁~10岁	不满8岁
单次剂量	5mL	3.3mL	2.5mL	×禁止服用

※每次使用后，请用水彻底清洗刻度量杯，并与本品一同存放，注意保持清洁。

### 〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 让儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

## 成分及作用

成分	每30ml中	作用
氢溴酸右美沙芬水合物	60mg	作用于延髓咳嗽控制中枢，抑制咳嗽的发生。
愈创甘油醚	170mg	提高呼吸道黏膜的分泌功能，稀释痰液并促进痰液排出。
马来酸氯苯那敏	12mg	缓解过敏性咳嗽。
无水咖啡因	62mg	辅助其他成分发挥作用。

辅料：果葡糖浆、乙醇、丙二醇、氯化钠、枸橼酸、苯甲酸钠、对羟基苯甲酸酯、乙基香兰素、焦糖、香兰素、*l*-薄荷醇、香料

## 治疗咳嗽、痰液时……

- 除服用本品外，还应注意以下事项。
- 保证充足的睡眠和营养，努力恢复体力。
  - 避免室内空气干燥。
  - 通过漱口等方式保护喉咙。

## 储存及处理注意事项

- (1) 请盖紧瓶盖，存放在阴凉处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 盖瓶盖时，请彻底擦拭瓶口后再盖上瓶盖。如果瓶口上还有药液附着就盖瓶盖，偶尔可能会变得难以打开。此外，如果没有盖好，可能会导致内容液漏出或受到污染。
- (5) 请勿服用过期产品。



## 咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。  
SS制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193  
受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商



**SS 制药株式会社**

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>