

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。
本文件仅作为参考信息, 请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管, 务必在服用前仔细阅读。】

DREWELL® EX

第②类药品

睡眠改善药 缓解暂时性失眠引起的以下症状 难以入睡、睡眠浅

● 用于此类情况或此类人群的暂时性失眠

- 压力大, 睡不着
- 明明很累, 神经却亢奋无法入睡
- 因心怀忧虑而半夜觉醒
- 不规律的生活导致睡眠节奏紊乱, 无法入睡



● DREWELL EX 的特点

- 有效成分“盐酸苯海拉明”对无法入睡、睡眠浅等症状具有优异疗效。
- 内容物为液状的胶囊型。1次1粒, 睡前服用。
- 含薰衣草香氛。

● DREWELL EX 的有效成分

DREWELL EX 的有效成分(盐酸苯海拉明)广泛用于舒缓皮肤瘙痒或抑制打喷嚏和流鼻涕等过敏症状, 但服用后会产生困意。

DREWELL EX 是一种利用盐酸苯海拉明所具有的产生困意的作用而制成的药物。



⚠ 使用注意事项



禁止事项

(如不遵守, 容易导致现有症状恶化, 或发生不良反应、事故。)

● 以下人群请勿服用

- (1) 孕妇或可能妊娠的妇女。
- (2) 不满15岁的儿童。
- (3) 经常性失眠者。
- (4) 被诊断为失眠者。

● 服用本品期间, 请勿使用以下任一药品

其他催眠镇静药、感冒药、解热镇痛药、镇咳祛痰药、含抗组胺药的口服药等(鼻炎口服药、晕车药、抗过敏药等)

● 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类

(可能会导致困意, 从而引起事故。此外, 若服用本品后至第二天仍持续犯困或感到疲倦, 则请勿驾驶交通工具或操作机械类, 直到这些症状消失。)

● 哺乳期妇女请勿服用本品, 或者服用本品时, 请避免哺乳

● 服用前后请勿饮酒

● 请仅在难以入睡或睡眠浅的时候服用本品, 切勿连用。



咨询事项

① 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者

- (1) 正在接受医生治疗者。
- (2) 老年人。(老年人可能会出现困意加剧或相反的神经亢奋等症状。)
- (3) 曾因药物等而出现过敏症状者。
- (4) 有以下症状者。排尿困难
- (5) 接受过以下诊断者。青光眼、前列腺增生



(接背面)

®: 注册商标

(承正面)

- 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
消化系统	胃痛、作呕感/呕吐、食欲不振
精神神经系统	头晕、头痛、起床时头沉重感、白天的困意、情绪不佳、神经紧张不安、暂时性意识混乱（注意力降低、类迷糊症状、判断障碍、言语与行为异常等）
循环系统	心悸
泌尿系统	排尿困难
其他	倦怠感

- 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药师或注册销售者

口干、腹泻

- 如果服用2~3次后症状仍未改善,请中止服用,并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。

其他注意事项

可能会到第二天仍持续犯困或感到疲倦。

适应证

缓解暂时性失眠引起的以下症状：难以入睡、睡眠浅

用法用量

难以入睡时或睡眠浅时,请按照以下单次剂量,1日1次,睡前用水或温水送服。

年龄	成人（年满 15 岁）	不满 15 岁
单次剂量	1 粒胶囊	禁止服用

〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
(2) 如果 1 次服用超过 1 粒胶囊，可能会出现神经亢奋等不适症状，反而导致失眠。
(3) 请仅在睡前服用，其他时段禁用。
(4) 胶囊的取出方法

如右图所示,请用指尖用力按压装有胶囊的PTP药板凸起部,压破背面的铝箔,取出后服用。

（如不慎直接将其吞服，会导致食管黏膜刺穿等意外事故。）



(PTP 药板取出示意图)

成分

1粒胶囊中

輔料：明膠、D-山梨醇、中鏈脂肪酸甘油三酯、聚維酮、聚乙二醇、甘油、苯甲醇、大豆卵磷脂、香料

储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
 - (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
 - (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
 - (4) 请勿服用过期产品。

咨询方式	请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。 SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193 受理时间：9:00～17:00（周六、周日、节假日除外）
------	---

生产销售商



SS 制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.in/>