

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品のパッケージをご確認ください。パッケージデザインは変更されている可能性があります。本文件仅作参考信息，请确认产品包装。包装设计可能已发生变更。



**NEW BRON  
SOLUTION-ACE**

®：注册商标

① 按压  
打开

接着，请打开②

适用于咳嗽/痰液 第②类医药品

**NEW BRON®液 ACE**

**120mL**

瓶盖：PP  
量杯包材：PP  
外包装封膜：PE、PP

生产销售商  
**SS 制药株式会社**  
东京都新宿区西新宿 3-20-2  
客户咨询室 电话 0120-028-193  
受理时间 9:00~17:00 (周六、周日、节假日除外)  
<https://www.ssp.co.jp/>

使用  
期限

- 〔注意〕1. 请勿过量服用或长期连用。  
2. 请遵守用法用量正确服用。  
3. 以下人群请勿服用。不满 12 岁的儿童。  
4. 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类。  
5. 哺乳期妇女请勿服用本品，或者服用本品时，请避免哺乳。  
6. 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者。  
(1) 正在接受医生治疗者。  
(2) 孕妇或可能妊娠的妇女。  
(3) 曾因药物等而出现过敏症状者。  
(4) 有以下症状者。高热、排尿困难  
(5) 接受过以下诊断者。青光眼、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症  
7. 服用时，请仔细阅读包装盒内侧的说明。  
8. 请盖紧瓶盖，存放在阴凉处，避免阳光直射。  
9. 服用后，请彻底擦拭瓶口后再盖上瓶盖。

适用于  
咳嗽/痰液

〔适应证〕咳嗽、痰液  
〔用法用量〕  
请按照以下单次剂量，用附带的刻度量杯量取，1日3次，均于餐后服用。需要说明的是，根据情况每日最多可服用6次，但在该情况下，请至少间隔4小时服用。

年龄	成人(年满15岁)	12岁~14岁
单次剂量	10mL	6.6mL

〔成分〕60mL 中  
磷酸双氢可待因 ..... 30mg  
愈创甘油醚 ..... 170mg  
马来酸氯苯那敏 ..... 12mg  
无水咖啡因 ..... 62mg

辅料：果葡糖浆、乙醇、丙二醇、氯化钠、枸橼酸、苯甲酸钠、对羟基苯甲酸酯、乙基香兰素、焦糖、香兰素、L-薄荷醇、香料

**NEW BRON  
液 ACE**

**NEW BRON 液  
ACE**

**NEW BRON 液  
ACE**

不良反应损害救济制度 电话 0120-149-931

NEW BRON SOLUTION-ACE

ANTITUSSIVE & EXPECTORANT

NEW BRON SOLUTION-ACE

ANTITUSSIVE & EXPECTORANT

**O**

接着，请从上方撕开③

② 按压打开

④1



第②类医药品

SSP CO., LTD. TOKYO JAPAN

第②类医药品

生产销售商  
SS 制药株式会社

第②类医药品

SSP CO., LTD. TOKYO JAPAN

**N**

**B**

**R**

为保护环境，未附说明书。

请妥善保管本包装盒，并务必在服用前阅读  
包装盒上的说明。

第②类医药品

# NEW BRON®液 ACE

## ⚠ 使用注意事项

### ⊗ 禁止事项

(如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生  
不良反应、事故。)

- 以下人群请勿服用  
不满 12 岁的儿童。
- 服用本品期间，请勿使用以下任一药品  
其他镇咳祛痰药、感冒药、镇静药、含  
抗组胺药的口服药等（鼻炎口服药、晕  
车药、抗过敏药、催眠镇静药等）
- 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类  
(可能会出现困意等。)
- 哺乳期妇女请勿服用本品，或者服用本品  
时，请避免哺乳
- 请勿过量服用或长期连用  
(可能会出现倦怠感和虚脱感等。)

### 咨询事项

- 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或  
注册销售者  
(1) 正在接受医生治疗者。  
(2) 孕妇或可能妊娠的妇女。  
(3) 曾因药物等而出现过敏症状者。  
(4) 有以下症状者。高热、排尿困难  
(5) 接受过以下诊断者。青光眼、呼吸功能  
障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥  
胖症
- 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，  
请立即中止服用，并持本包装盒咨询医生、  
药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
消化系统	作呕感/呕吐、食欲不振
精神神经系统	头晕
泌尿系统	排尿困难

偶尔可能出现以下严重症状。这种情况下，请立  
即就医。

症状名称	症状
再生障碍性 贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、 发热、皮肤或黏膜苍白、疲 劳、心悸、呼吸短促、感到恶 心和头晕、血尿等。
粒细胞缺乏 症	突发高热、发冷、喉咙痛等。
呼吸抑制	出现呼吸短促、呼吸困难等。

- 服用后，可能会出现以下症状，如果这种  
症状持续或恶化，请中止服用，并持本包  
装盒咨询医生、药剂师或注册销售者 便  
秘、口干、困意
- 如果服用 5~6 次后症状仍未改善，请中  
止服用，并持本包装盒咨询医生、药剂师  
或注册销售者

### 适应证

咳嗽、痰液

### 用法用量

请按照以下单次剂量，用附带的刻度量杯量取，1 日 3 次，  
均于餐后服用。需要说明的是，根据情况每日最多可服用  
6 次，但在该情况下，请至少间隔 4 小时服用。

年龄	成人(年满 15 岁)	12 岁~14 岁	不满 12 岁
单次 剂量	10 mL	6.6 mL	× 禁止服用

※ 每次使用后，请用水彻底清洗刻度量杯，并与  
本品一同存放，注意保持清洁。

#### 〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 让儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

### 成分及作用

成分	60ml 中	作用
磷酸双氢可待因	30mg	作用于延髓咳嗽中 枢，抑制咳嗽的 发生。
愈创甘油醚	170mg	提高呼吸道黏膜的分泌 功能，稀释痰液并促进 痰液排出。
马来酸氯苯那敏	12mg	缓解过敏性咳嗽。
无水咖啡因	62mg	辅助其他成分发挥作 用。

辅料：果葡糖浆、乙醇、丙二醇、氯化钠、枸橼  
酸、苯甲酸钠、对羟基苯甲酸酯、乙基香兰素、  
焦糖、香兰素、*l*-薄荷醇、香料

### 储存及处理注意事项

- (1) 请盖紧瓶盖，存放在阴凉处，避免阳光直  
射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。(可能会导致误  
用或变质。)
- (4) 盖瓶盖时，请彻底擦拭瓶口后再盖上瓶  
盖。如果瓶口上还有药液附着就盖瓶盖，  
偶尔可能会变得难以打开。此外，如果没  
有盖好，可能会导致内容液漏出或受到污  
染。
- (5) 请勿服用过期产品。

### 咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193  
受理时间：9:00~17:00 (周六、周日、节假日除外)

®：注册商标