



注意

1. 次の人は服用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 15才未満の小児。(3) 次の診断を受けた人。肝臓病 2. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないでください。3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。4. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) アレルギーによる症状が他の原因によるアレルギー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。(7) エピナスチン塩酸塩を10mg含有する医薬品から本剤に変更しようとしている人。5. 服用に際しては、箱内側の説明をよく読んでください。6. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

成分

1錠(1日量) 中 エピナスチン塩酸塩.....20mg
添加物: 無水ケイ酸、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、メタクリル酸メチル、ポリマー、マクロゴール、シリコーン樹脂、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トモロシチン、花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和: 鼻みず、鼻づまり、くしゃみ

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

第2世代抗ヒスタミン成分 持続性<エピナスチン塩酸塩>配合



鼻炎に早めから
しっかりと対処

眠くなりにくい



*1日1回1錠を就寝前に服用(15才未満:服用不可)

たった1錠で
24時間ずっと効く*

製品特長

FSC
ミックス
パルプ
FSC
認証
C008630

第2類医薬品 アレジオン20

24日分 24錠

眠くなりにくい* 1日1回 24時間効く

※エピナスチン塩酸塩配合

アレジオン20 第2類医薬品

用法・用量

次の1回量を1日1回、就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1錠	×服用しないこと

初めてアレジオン20を使用される方は、6錠入り又は12錠入りの製品からのご購入をおすすめします。

24日分 花粉・ハウスダストなどによる鼻水・鼻づまり・くしゃみに

アレルギー専用鼻炎薬

アレジオン20

たった1錠で24時間ずっと効く*

眠くなりにくい*

※エピナスチン塩酸塩配合

第2類医薬品

エスエス製薬
an Opella. company

* 1日1回1錠を就寝前に服用(15才未満:服用不可)

お客様相談室
電話 0120-028-193
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)
<https://www.ssp.co.jp/>

わたしオン
アレジオン

花粉などの季節性のアレルギー性鼻炎症状に使用する場合は、花粉飛散予測日から、又は、症状が出始めたら早めに服用を始めると効果的です。

必ずここから開けてください
箱内側の説明をお読みください

開け口



製造販売元



エスエス製薬株式会社
東京都新宿区西新宿3-20-2

環境保全のため説明書は入っていません。
この箱は大切に保管し、服用前に箱の説明を必ずお読みください。

【使用上の注意】 **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。） 1. 次の人は服用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 15才未満の小児。(3) 次の診断を受けた人。肝臓病 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等） 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがあります。） 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 5. 服用前後は飲酒しないでください。

相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。(6) 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。(7) エピナスチン塩酸塩を10mg含有する医薬品から本剤に変更しようとしている人。 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚：発疹・発赤、はれ、かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感、腹痛、胃重感、胃もたれ感、腹部膨満感、食欲不振 精神神経系：めまい、不眠、頭痛、頭がボーッとする、しびれ感、悪夢、幻

覚、幻聴 呼吸器：息苦しい 循環器：動悸 泌尿器：排尿困難、頻尿、血尿、蛋白尿 その他：むくみ、ほてり、胸痛、痰がからむ、倦怠感、鼻づまり、月経異常、苦味を感じる、味覚が弱くなる、女性化乳房（男性に見られる女性のような乳房）、乳房が大きくなる まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれ

る。 血小板減少：血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、便秘、下痢、眠気 4. 1週間位服用（他のエピナスチン塩酸塩を含有する医薬品の服用期間を含む）しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 5. 症状の改善が見られても2週間（他のエピナスチン塩酸塩を含有する医薬品の服用期間を含む）を超えて服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】成人（15才以上）1回1錠を1日1回就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 15才未満は服用しないでください。(2) 用法・用量を厳守してください。(3) 花粉などの季節性のアレルギー性鼻炎症状に使用する場合は、花粉飛散予測日から、又は、症状が出始めたら早めに服用を始めると効果的です。(4) 錠剤の取り出し方右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）(4) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。