

Cialis®

指示藥（需藥師指導藥品）

【勃起功能障礙的治療藥】

銷售名稱：Cialis®

- 本藥劑是男性勃起功能障礙的治療藥。勃起功能障礙是指男性無法達到足夠堅挺的勃起，或無法維持勃起的狀態，以進行滿意的性交的一種疾病。
- 有效成分他達非能放鬆陰莖血管，增加流向陰莖的血液。
- 本藥劑單獨服用是不會引起勃起。只有在受到性刺激時才會勃起。服藥後約 30 分鐘開始見效，被認可服用後藥效可長達 36 小時。
- 飯前或飯後均可服用。
- 本藥劑沒有預防性傳染病的效果。



使用上的注意事項



禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外。）

❶ 下列的人請勿服用

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
- (2) 正在服用常用於治療狹心症等心臟疾病使用的硝化甘油（Millisrol 等）、亞硝酸异戊酯、二硝酸異山梨醇酯（硝基 Nitorol、Frاندol 等）和尼可地爾（Sigmart 等）等的硝酸劑的人。（請仔細確認目前正在服用的藥物）
- (3) 正在服用利奧西呱（Adempas 等）、酮康唑（口服藥物，日本國內尚未銷售）、伊曲康唑（Itrazole 等）、克拉黴素（Clarith、Klaricid 等）的人。（請仔細確認目前正在服用的藥物）
- (4) 因心血管疾病等，被認為不適合進行性行為的人。
- (5) 患有不穩定型狹心症的人，或在性行為中出現過狹心症的人。
- (6) 即使服用藥物也無法控制心律不整的人、低血壓的人（血壓<90/50mmHg）或即使服用降血壓藥後血壓仍然偏高的人（安靜時血壓>170/100mmHg）。
- (7) 過去 3 個月內曾發生過心肌梗塞的人。
- (8) 過去 6 個月內曾發生腦梗塞或腦出血的人。
- (9) 被醫生告知肝臟功能異常的人。
- (10) 被醫生告知腎臟功能異常的人。
- (11) 接受過下列診斷的人。視網膜色素變性
- (12) 女性。

（性行為會對心臟造成風險。懷疑自己患有心臟或心血管疾病的人，請務必事先諮詢醫生。這可能會引發心肌梗塞等。）

❷ 葡萄柚汁等會影響本藥物的療效，所以請不要飲用



諮詢事項

❶ 下列的人在服用前請諮詢醫生或藥劑師

- (1) 正在接受醫生治療、服用醫生處方藥或服用以下任何藥劑的人。前列腺肥大症治療藥或者降血壓藥（α 受體阻滯劑（多沙唑嗪等）、氫氯地平）、抗 HIV 藥（利托那韋、沙奎那韋等）、抗菌藥（利福平等）、抗癲癇藥（苯妥英、苯巴比妥等）
- (2) 年長者。
- (3) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
- (4) 接受過下列診斷的人。持續勃起症（勃起持續超過 4 小時）、血液疾病（鎌型血球貧血、多發性骨髓瘤、白血病等）、出血性疾病、消化性潰瘍、陰莖變形（陰莖彎曲、陰莖纖維化、佩羅尼氏症等）
- (5) 正在接受其他勃起功能障礙治療的人。
- (6) 在進行輕度或中度運動（例如快走約 20 分鐘、快步跑上一層樓梯等）時，出現嚴重呼吸困難或感覺胸痛的人。

❷ 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫生或藥劑師

關係部位	症 狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、多汗、指甲周圍發炎
消化器官	噁心、嘔吐、消化不良、胸口灼熱、腹瀉、口乾、胃炎、腹痛、胃部不適、便秘、腹脹、軟便、吞嚥困難、胃酸逆流
精神神經系統	頭痛、頭暈、睡眠障礙、刺痛感、嗜睡、焦慮、偏頭痛、麻木
感覺器官	視力模糊、眼睛疼痛、流淚、眼睛不適感、充血、眼分泌物、耳鳴、視力障礙、眼瞼腫脹
循環器官	心悸、發燙、胸痛、脈搏加快、昏厥、高血壓、低血壓、冷汗、意識模糊、身體單側手腳無力、說話困難

(接正面)

關係部位	症 狀
呼吸器官	呼吸困難、鼻塞、鼻炎、咳血、流鼻血、喉嚨腫脹
泌尿器官	排尿困難、勃起增強、異常或持續勃起
其他	疲勞、倦怠感、發熱、浮腫、黏膜浮腫、疼痛、背痛、肌肉痛、關節痛、頸痛、臀部疼痛、肌肉痙攣、肌肉骨骼僵硬、體重增加

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫生的診療。

症狀的名稱	症 狀
過敏症	發疹、蕁麻疹、臉部腫脹
剝脫性皮膚炎	幾乎全身的皮膚都發紅、類似頭皮屑或痂皮的鱗屑附著在上面、這些鱗屑會剝落，而且常常伴隨發燒
皮膚黏膜眼症候群 (史蒂芬斯-強森症候群)	高燒、眼睛充血、眼分泌物、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚大面積的發疹和發紅等症狀持續存在或迅速惡化

- ③ 服用後，若出現視力突然下降或失明症狀時，請停止服用，並立即接受眼科醫生的診療
- ④ 服用後，勃起可能持續 4 小時以上。若勃起持續 6 小時以上的話，延遲治療可能會導致勃起功能喪失。若勃起持續 4 小時以上，請立即接受醫生的診療
- ⑤ 若服用 4~8 次後仍未見效果，請攜帶本說明書諮詢醫生或藥劑師（勃起功能障礙可能與心臟病、高血壓或糖尿病等疾病有關，因此請盡早諮詢醫生或藥劑師。）
- ⑥ 服用後，若在高處作業、駕駛車輛或操作機械時請務必小心（可能會出現頭暈、視力模糊等症狀）

療效和效果

勃起功能障礙

（無法充分勃起和無法維持勃起，無法進行滿意的性行為的人）

〈關於療效和效果的注意事項〉

(1) 本藥劑並非催情劑或性慾增強劑。(2) 本藥劑沒有預防性傳染病的效果。(3) 單獨服用本藥劑不會引起勃起，只有在受到性刺激時才會出現勃起。服藥後約 30 分鐘開始見效，服用後藥效可長達 36 小時。

用法和用量

成年男性（18 歲以上）1 次 1 錠，請在性行為前約 1 小時用水或溫水服用。每天請勿服用超過 1 錠。另外，兩次服用之間請至少間隔 24 小時。

〈關於用法和用量的注意事項〉

- (1) 請嚴格按照用法和用量服用。
- (2) 飯前或飯後均可服用。
- (3) 若飲酒過量時，請勿服用本藥劑。
- (4) 不建議連續每天服用。若每天服用的話，請諮詢醫生。
- (5) 錠劑取出的方法 如右圖所示，用指尖用力按壓含有錠劑的 PTP 薄膜的凸起部分，將背面的鋁箔弄破，取出藥劑後服用。（若不小心將整顆吞下，可能會導致卡在食道粘膜裡等意想不到的意外。）



（圖示說明如何從 PTP 薄膜取出）

成 分

他達拉非 10mg

1 錠中

添加物：羧甲基纖維素鈉、纖維素、乳糖、羥丙基纖維素、羥丙基甲基纖維素、硬脂酸鎂、滑石、二氧化鈦、三氧化二鐵、三醋酸精、十二烷基硫酸鈉

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。（可能導致誤用或變質。）
- (4) 請不要服用使用期限已過期的藥物。



聯絡窗口

請聯絡您購買的商店或諮詢我們客戶服務部門。
SS 製藥株式會社 客戶服務部門 電話 0120-028-193
服務時間：上午 9:00 至下午 5:00（週六、週日及節日除外）

製造銷售商



SS 製藥株式會社

郵遞區號 163-1444 日本東京都新宿區西新宿 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>