

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。

本説明書僅供產品資訊參考・正確內容請以產品所附的原始說明書為準。

底線部分：2023年1月修訂

【請將本說明與本藥劑一同保管，服用藥劑時請務必詳閱。】

# S.TAC<sup>®</sup>綜合感冒藥

第②類醫藥品

綜合感冒藥 全家（5歲以上）感冒皆適用 膜衣錠

- S.TAC 綜合感冒藥是一款從5歲起全家人均可服用的家庭用綜合感冒藥。
- 為對感冒11種症狀發揮確實效果而設計之處方，並採用易於服用之膜衣錠。

## ⚠ 使用上的注意事項



### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外。）

#### ● 下列的人請勿服用

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
- (2) 曾服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥，引發氣喘的人。

#### ● 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品

其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥、催眠鎮靜藥等）

#### ● 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類

（可能出現嗜睡等。）

#### ● 服用前後，請勿飲酒

#### ● 請勿長期連續服用



### 諮詢事項

#### ● 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
- (2) 孕婦或可能懷孕的人。
- (3) 正在哺乳的人。
- (4) 年長者。
- (5) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
- (6) 有下列症狀的人。發高燒、排尿困難
- (7) 接受過下列診斷的人。甲狀腺功能障礙、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、青光眼



#### ● 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹・發紅・發癢
消化器官	噁心・嘔吐・食欲不振
精神神經系統	頭暈

相關部位	症狀
呼吸器官	氣短・呼吸困難
泌尿器官	排尿困難
其他	過度的體溫低下

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
皮膚黏膜眼症候群（史蒂芬強生症候群）、中毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿疱症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿疱）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。
藥物性過敏症候群	出現皮膚廣範圍變紅、全身性發疹、發燒、身體倦怠、淋巴結（頸部、腋下、鼠蹊部等）腫脹等。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

（續見背面）

®：註冊商標

(接正面)

症狀名稱	症狀
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。
再生不良性貧血	出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。
無顆粒性白血球症	出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

口乾、嗜睡

●即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

### 療效・效果

緩和感冒的各項症狀(喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、發燒、惡寒、頭痛、打噴嚏、咳嗽、生痰、關節痛、肌肉疼痛)

### 用法・用量

每日3次，請依下列1次劑量，儘量於飯後30分鐘內以水或溫水服用。

年齡	成人(15歲以上)	11歲~14歲	5歲~10歲	未滿5歲
1次劑量	 3錠	 2錠	 1錠	✗ 請勿服用

#### 〈用法・用量相關的注意事項〉

- (1)請嚴守用法・用量。
- (2)使兒童服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。

### 成分


每9錠  
(成人1日劑量)中

對乙醯氨基酚.....	900 mg	甘草萃取物	
馬來酸氯苯那敏.....	7.5 mg	(相當於甘草750 mg).....	187.5 mg
氫溴酸右美沙芬水合物.....	48 mg	生薑粉.....	150 mg
dI-鹽酸甲基麻黃鹼.....	60 mg	無水咖啡因.....	75 mg
橙皮苷.....	45 mg		

添加物：交聯羧甲基纖維素鈉、無水二氧化矽、纖維素、乳糖、羥丙基甲基纖維素、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、硬脂酸鎂、滑石粉、氧化鈦、玉米澱粉、三氧化二鐵

### 保管及使用上的注意事項

- (1)請存放於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
- (2)請保管於兒童拿不到的地方。
- (3)請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或品質變質。)
- (4)請將瓶蓋確實關緊。如未確實關緊，可能因受潮等而變質。此外，請勿以濕手拿取本藥劑。
- (5)瓶中的填充物是為了防止錠劑在運輸過程中受損。開啟後即不再需要，請將其丟棄。
- (6)超過使用期限請勿服用。



### 諮詢聯絡窗口

請諮詢原購買店鋪或客戶諮詢室。  
SS製藥株式會社 客戶諮詢室 電話 0120-028-193  
受理時間：9時至17時30分(不含週六、日及國定假日)

製造銷售商



SS製藥株式會社

〒163-1488 東京都新宿區西新宿3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>

21

00008455