

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。
本文件仅作为参考信息，请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

GASTOL® 细粒

第②类医药品

胃肠药 含有 M₁ 受体阻滞剂

- 胃灼热是由暴饮暴食等导致胃酸返流所引起的。此外，因压力等而分泌过多的胃酸一旦刺激胃部，便会引发胃痛。
- GASTOL 细粒的速效抗酸剂（碳酸氢钠）和持效性抗酸剂（偏硅酸铝镁）可有效中和和分泌过多的胃酸，M₁ 受体阻滞剂（盐酸哌仑西平水合物）从源头抑制过多的胃酸分泌，从而抑制胃灼热和胃痛，同时保护受损的胃黏膜。更有消化酶帮助减轻餐后胃部的负担。



⚠ 使用注意事项

⊗ **禁止事项** (如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生不良反应、事故。)

- ① 以下人群请勿服用
 - (1) 曾因本品或本品成分而出现过敏症状者。
 - (2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
 - (3) 正在接受透析治疗者。
- ② 服用本品期间，请勿服用以下任一药品
胃肠解痉镇痛药、晕车药
- ③ 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类
(可能会出现视物模糊、异常畏光等症状。)
- ④ 请勿长期连用



咨询事项

- ① 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者
 - (1) 正在接受医生治疗者。
 - (2) 哺乳期妇女。
 - (3) 老年人。
 - (4) 曾因药物等而出现过敏症状者。
 - (5) 有以下症状者。 排尿困难
 - (6) 接受过以下诊断者。 青光眼、肾脏疾病
- ② 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
消化系统	作呕感、胃胀感
循环系统	心悸
泌尿系统	排尿困难
其他	视物模糊

偶尔可能出现以下严重症状。这种情况下，请立即就医。

症状名称	症状
类速发严重过敏反应症状	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难等。
粒细胞缺乏症	突发高热、发冷、喉咙痛等。

(承正面)

③ 服用后,可能会出现以下症状,如果这种症状持续或恶化,请中止服用,并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

口干、便秘、腹泻

④ 如果服用 2 周左右症状仍未改善,请中止服用,并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

适应证

- 胃痛、胃灼热、胃酸过多、胸闷、暖气
- 不消化、胃沉重、胃部不适、胃胀感
- 作呕感(反胃、胃翻腾感、宿醉/醉酒反胃、作呕、恶心)、呕吐、饮酒过度
- 暴饮暴食、消化不良、消化不良引起的胃胀和腹胀、促进消化、食欲不振

用法用量

请按照以下单次剂量,1日3次,每餐后用水或温水送服。

年龄	成人(年满15岁)	不满15岁
单次剂量	1包	×禁止服用

〈用法用量相关注意事项〉

○请严格遵守用法用量。

成分及作用

3包(日剂量)中

成分	3包中	作用
盐酸哌仑西平水合物 <M ₁ 受体阻滞剂>	47.1mg (以盐酸哌仑西平无水物计45mg)	抑制过多的胃酸分泌。
偏硅酸铝镁	900mg	中和胃酸的同时,保护胃黏膜。
碳酸氢钠	1,200mg	快速中和胃酸。
生物淀粉酶 2000	30mg	促进食物消化。

辅料:无水硅酸、纤维素、乳糖、硬脂酸镁、*l*-薄荷醇

储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处,避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。(可能会导致误用或变质。)
- (4) 请勿服用过期产品。



咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间: 9:00~17:00 (周六、周日、节假日除外)