



この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。  
本文件仅作为参考信息，请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

**SURULAC®S**

第②类医药品

**刺激性便秘药**

- SURULAC-S 通过两种刺激性成分促进肠蠕动。这是一款对顽固性重度便秘有效的刺激性便秘药。
- 虽然存在个体差异，但有效成分比沙可啶的大致起效时间为6~12小时。睡前服用，次日早上即可见效。
- 可根据便秘症状，在1~3片的范围内调整服用量和药效。
- 片剂经包衣处理，以确保有效成分在肠道充分发挥作用，而不在胃部溶解。

**⚠ 使用注意事项**



**禁止事项**

( 如不遵守，容易导致现有症状恶化，  
或发生不良反应。 )

- ① 服用本品期间，请勿服用以下药品  
其他导泻剂（泻药）
- ② 哺乳期妇女请勿服用本品，或者服用本品时，请避免哺乳
- ③ 请勿大量服用



**咨询事项**

- ① 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者
  - (1) 正在接受医生治疗者。
  - (2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
  - (3) 曾因药物等而出现过敏症状者。
  - (4) 有以下症状者。剧烈腹痛、作呕感/呕吐
- ② 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者



相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
消化系统	剧烈腹痛、作呕感/呕吐

- ③ 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者  
腹泻
- ④ 如果服用 1 周左右症状仍未改善，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

**适应证**

- 便秘
- 缓解便秘伴有的以下症状：腹胀、食欲不振（食欲减退）、痔疮、皮肤粗糙、痘痘、肠内异常发酵、头沉重、头部充血

## 用法用量

请按照以下单次剂量，1日1次，睡前（或空腹时）用水或温水送服。但首次请使用最小剂量，并根据排便情况和状态逐渐增加或减少剂量。

年龄	成人（年满15岁）	不满15岁
单次剂量	1~3片	×禁止服用

●空腹的参考服用时间：尽可能在餐后2小时或以上

### 〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 本品为肠溶片，请直接服用，不要咀嚼或弄碎。此外，请勿与抗酸剂或牛奶同时服用。
- (3) 片剂的取出方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的 PTP 药板凸起部，压破背面的铝箔，取出后服用。（如不慎直接将其吞服，会导致食管黏膜刺穿等意外事故。）



- (4) 请用1杯（约180ml）水或温水送服。

## 成分及作用

成分	3片中	作用
比沙可啶	15mg	从大肠上段开始发挥作用，使迟缓的肠蠕动变得活跃。
番泻苷钙	40mg (以番泻苷A、B计为15.8mg)	在肠道细菌的作用下变得活跃，改善肠蠕动。

辅料： 羧甲基纤维素钙、纤维素、乳糖、蔗糖、羟丙甲纤维素、羟丙甲纤维素邻苯二甲酸酯、聚维酮、聚乙二醇、阿拉伯胶、高岭土、碳酸钙、巴西棕榈蜡、脂肪酸甘油酯、硬脂酸镁、虫胶、滑石粉、二氧化钛、马铃薯淀粉、红色2号、红色3号

○服用本品后，尿液可能会带橙色或红色。

## 储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿服用过期产品。

## 咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）



生产销售商

SS 制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>