

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

ANERON “NYSCAP”

第②类医药品

晕车药

- ANERON “NYSCAP” 是一种胶囊剂，对预防和缓解晕动病引起的作呕感、头晕、头痛等症状具有优异疗效。
- 含有 5 种有效成分。1 日 1 次、1 次 1 粒即可起效的持效性制剂。
- 餐前餐后均可服用。即使晕车后再服用仍有效。
- 直接作用于胃部，预防并缓解作呕感。
- 为预防晕动病，请在乘车乘船前 30 分钟服用。

⚠ 使用注意事项



禁止事项

（如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生不良反应、事故。）

- ❶ 以下人群请勿服用
不满 15 岁的儿童。
- ❷ 服用本品期间，请勿使用以下任一药品
其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、胃肠解痉镇痛药、含抗组胺药的口服药等（鼻炎口服药、抗过敏药等）
- ❸ 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类
（可能会出现困意或视物模糊、异常畏光等症状。）



咨询事项

- ❶ 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者
(1) 正在接受医生治疗者。
(2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
(3) 老年人。
(4) 曾因药物等而出现过敏症状者。
(5) 有以下症状者。排尿困难
(6) 接受过以下诊断者。青光眼、心脏病
- ❷ 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者



相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
精神神经系统	头痛
循环系统	心悸
泌尿系统	排尿困难
其他	面部潮热、异常畏光

- ❸ 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者
口干、便秘、腹泻、困意、视物模糊

适应证

预防和缓解晕动病引起的作呕感、头晕、头痛

用法用量

请按照以下单次剂量，1日1次，用水或温水送服。
但是，为预防晕动病，请在乘车乘船前30分钟服用。

年龄	成人（年满15岁）	不满15岁
单次剂量	1粒胶囊	×禁止服用

〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 餐前餐后均可服用。

成分

1粒胶囊中

马来酸非尼拉敏	30mg
氨基苯甲酸乙酯	50mg
氢溴酸东莨菪碱水合物	0.2mg
无水咖啡因	20mg
盐酸吡哆醇（维生素B ₆ ）	5mg

辅料：二氧化硅、明胶、纤维素、蔗糖、羟丙基纤维素、乙基纤维素、脂肪酸甘油酯、滑石粉、玉米淀粉、甲基丙烯酸共聚物 L、十二烷基硫酸钠、没食子酸丙酯、维生素 B₂、红色 3 号、黄色 5 号、蓝色 1 号

给易晕车人士的建议

- 乘坐公共汽车、船只、飞机等的前一晚请注意避免睡眠不足。
- 适量食用易消化的食物，调整肠胃状态。
- 尽量选择颠簸较少的座位，以放松的姿势舒适地乘坐。
- 透过窗外眺望远处的景色，或者通过聊天、玩游戏等方式来转移注意力。
- 提前服用晕车药则效果更佳。

储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿服用过期产品。

咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）

