

00007772

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。

本文件仅作为参考信息，请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

Buscopan® A 片

第 2 类医药品

解痉镇痛药 适用于胃痛、腹痛

- 胃痛、腹痛、绞痛等疼痛是由胃肠过度紧张和痉挛引起的。
- Buscopan A 片可缓解异常的胃肠紧张，对胃痛、腹痛和绞痛等疼痛具有出色的效果。

⚠ 使用注意事项

⊗ 禁止事项 (如不遵守，容易导致现有症状恶化，或 发生不良反应、事故。)

- 以下人群请勿服用
曾因本品或本品成分而出现过敏症状者。
- 服用本品期间，请勿服用以下任一药品
其他胃肠解痉镇痛药、其他含有莨菪浸膏的胃肠药物、晕车药
- 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类
(可能会出现视物模糊、异常畏光等症状。)



咨询事项

- 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者
 - (1) 正在接受医生治疗者。
 - (2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
 - (3) 老年人。
 - (4) 曾因药物等而出现过敏症状者。
 - (5) 有以下症状者。排尿困难
 - (6) 接受过以下诊断者。心脏病、青光眼
- 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者



相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
精神神经系统	头痛
泌尿系统	排尿困难
其他	面部潮热、异常畏光

偶尔可能出现以下严重症状。这种情况下，请立即就医。

症状名称	症状
休克 (速发严重过敏反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识混浊等。

- 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者
口干、便秘、视物模糊
- 如果服用 5~6 次后症状仍未改善，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

适应证

胃痛、腹痛、绞痛（疝痛、痉挛）、胃酸过多、胃灼热



胃痛



腹痛

用法用量

请按照以下单次剂量，1日最多服用3次，用水或温水送服。服用至少间隔4小时。

年龄	成人（年满15岁）	不满15岁
单次剂量	1片	×禁止服用

〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 片剂的取出方法 如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的PTP药板凸起部，压破背面的铝箔，取出后服用。（如不慎直接将其吞服，会导致食管黏膜刺穿等意外事故。）



成分

丁溴东莨菪碱 ······ 10mg

1片（单次剂量）中

辅料： 乳糖、蔗糖、聚乙二醇、阿拉伯胶、巴西棕榈树蜡、白蜂蜡、硬脂酸镁、虫胶、滑石粉、二氧化钛、玉米淀粉、十二烷基硫酸钠、酒石酸

储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿服用过期产品。



咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商



SS 制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>