

吸湿しやすいため、服用のつどチェックをしっかりとして下さい。

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

販売名：ビーボ酸化マグネシウム錠

第3類医薬品

製品の特徴：酸化マグネシウムは、腸内水分を調整し、便を柔らかくし自然なお通じを促す為、お腹が痛くなりにくいのが特長です。十分な水と共に服用することでより確実な作用が期待出来ます。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化し、副作用が起こりやすくなる)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと：他の瀉下薬(下剤)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 次の症状のある人：はげしい腹痛、吐き気・嘔吐。(5) 次の診断を受けた人：腎臓病。2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
精神神経系	強い眠気、意識がうすれる
循環器	立ちくらみ、脈が遅くなる

関係部位	症状
呼吸器	息苦しい
その他	筋力の低下、口のかわき

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること：下痢。4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

用法・用量 次の量を就寝前にコップ1杯の水で服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は、減量すること。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3～6錠	1回
11歳～14歳	2～4錠	
7歳～10歳	2～3錠	
5歳～6歳	1～2錠	
乳幼児(5歳未満)	服用しないこと	

●用法関連注意 (1) 定められた用法、用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

効能・効果 ○便秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

成分分量 6錠(大人の1日量)中

成分	分量
酸化マグネシウム	2000mg

添加物：クロスカルメロースナトリウム(クロス CMC-Na)、ショ糖脂肪酸エステル、結晶セルロース

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わるため)。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発売元 / お客様相談室
株式会社エムボックス

住所：東京都豊島区
巣鴨1丁目20-10
宝生第一ビル6階B
電話：03-6822-3723
受付時間：9:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

製造
番号

使用
期限

製造販売 

原沢製薬工業株式会社
東京都港区高輪3丁目19番17号

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



**MADE IN
JAPAN**

PE、金属 E335P2①