

▼セルフチェックシート▼

本剤又は本剤の成分により アレルギー症状を起こしたことがある	YES→	使用しないでください。
No ↓		
男性である	YES→	使用しないでください。(本品は女性用です。)
No ↓		
20歳未満である	YES→	使用しないでください。(本剤での未成年における有効性および安全性は確認されていません。)
No ↓		
妊婦又は妊娠していると思われる、又は授乳中である。	YES→	使用しないでください。(妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。)
No ↓		
妊娠、出産に伴い脱毛している。	YES→	使用しないでください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。)
No ↓		
避妊用のピルの使用をやめたことで脱毛している。	YES→	
No ↓		
頭髮以外の体毛(まゆ毛など)が脱毛している。	YES→	
No ↓		
髪を頭皮から強く引っ張るような髪型により脱毛している。	YES→	
No ↓		
頭髮が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部分が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。	YES→	使用しないでください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。)
No ↓		
急激に脱毛している。	YES→	
No ↓		
下図のような症状の脱毛・薄毛ではない。 	YES→	使用しないでください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。)
No ↓		
家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。	YES→	使用しないか、使用する前に医師又は薬剤師にご相談ください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。)
No ↓		
高血圧、低血圧で現在治療を受けている。 狭心症等、心臓に障害がある。	YES→	使用を控えられることをおすすめします。 使用する場合は、必ず、医師又は薬剤師にご相談ください。(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
No ↓		
甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、 甲状腺機能亢進症)の診断を受けている。	YES→	使用しないでください。(甲状腺疾患による脱毛の可能性あります。)
No ↓		
薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある。 高血圧又は低血圧である。 心臓や腎臓に障害がある。むくみがある。	YES→	使用する前に医師又は薬剤師にご相談ください。(副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
No ↓		
65歳以上である。	YES→	使用する前に医師又は薬剤師にご相談ください。 (一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。)
No ↓		
頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)がある。	YES→	きず、湿疹あるいは炎症(発赤)を治してから再確認してください。(きず等を悪化させることがあります。)
No ↓		
上記のいずれにも該当しない。	YES→	使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みになり、ご購入ください。

※人によっては、本剤の使用により適用部位の皮膚症状(副作用)が現れることがあります。

適用部位に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等が現れた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してその指示を受ける必要があります。

※ご不明な点がございましたら、薬剤師にご相談ください。