

ヒックス ミノキシジル5 プラス

【ご購入前に】

- 次の方は必ず医師又は薬剤師にご相談ください。
 - ・高血圧・低血圧で現在治療中の方
 - ・狭心症等、心臓に障害のある方
- ヒックス ミノキシジル5 プラスを適正にお使いいただけるよう、「セルフチェックシート」をご用意しています。ヒックス ミノキシジル5 プラスがご自分の症状に適しているかをセルフチェックしてください。

【この薬は？】

販売名	ヒックス ミノキシジル5 プラス
一般名	ミノキシジル (Minoxidil) ピリドキシン塩酸塩 (Pyridoxine Hydrochloride) トコフェロール酢酸エステル (Tocopherol Acetate) l-メントール (l-Menthol)
含有量(100 mL中)	ミノキシジル (5.0 g) ピリドキシン塩酸塩 (0.05 g) トコフェロール酢酸エステル (0.08 g) l-メントール (0.3 g)

使用者向医薬品ガイドについて

使用者向医薬品ガイドは、使用者の皆様や家族の方などに、医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。
したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、わかりやすく記載しています。
医薬品の使用による副作用と考えられる場合には、ただちに医師又は薬剤師に相談してください。
ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

【この薬の効果は】


- ・この薬は発毛剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は毛包に直接作用して、細胞の増殖やタンパク質の合成を促進することによって、休止期毛包から初期成長期毛包への移行促進作用及び初期成長期毛包から後期成長期毛包への移行促進及び維持作用を示します。
- ・この薬は、「壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防」を効能・効果に持つ薬です。

【効能・効果】

- 壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。

●この医薬品の対象となる壮年性脱毛症

・ヒックス ミノキシジル5 プラスは、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛に効果があります。



※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。

【この薬を使う前に、確認すべきことは】

- 次の人は使用しないでください。
 - ・本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ・女性。
 - ・20歳未満の人。
 - ・壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人。あるいは原因の分からない脱毛症の人。
 - ・脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
- 次の部位には使用しないでください。
 - ・本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
 - ・きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。
- 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。
- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - ・今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 - ・高血圧の人、低血圧の人。
 - ・心臓又は腎臓に障害のある人。
 - ・むくみのある人。
 - ・家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。
 - ・高齢者（65歳以上）。
 - ・次の診断を受けている人。
 - 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）。
- 甲状腺機能障害による脱毛症との鑑別
 - ・甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の診断を受けている人は、甲状腺疾患による脱毛の可能性があるので、治療を受けている医師に相談してください。

【この薬の使い方は】

- 使用量および回数
 - ・成人男性（20歳以上）は、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布します。
- 使用し忘れたとき
 - ・朝に使い忘れたからと言って夜に2mLをまとめて使用することは、かえって副作用が起こる可能性があるのでおやめください。
- 多く使用したとき（過剰投与時）
 - ・用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。（決められた以上に多く使用しても、効果の増

加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります)

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは】

- 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

*頭皮以外にあらわれることもあります。

- 6ヵ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - ・脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)
- 使用開始後6ヵ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - ・頭髮以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。

【この薬の形は】

販売名	ヒックス ミノキシジル5 プラス
内容量	60mL
性状	無色澄明～微黄色澄明のローション剤で、特異なおいがある。

【この薬に含まれているのは】

有効成分	ミノキシジル、L-メントール、トコフェロール酢酸エステル、ピリドキシン塩酸塩
添加物	無水エタノール、精製水、ラウロマクロゴール、濃グリセリン、ジブチルヒドロキシルエーテル、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ユーカリ油、ピロ亜硫酸ナトリウム

【その他】

- この薬の保管方法は？
 - ・使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所をさけ、涼しい所に保管してください。
 - ・小児の手のとどかない所に保管してください。
 - ・誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
 - ・火気に近づけないでください。
 - ・使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- その他の注意
 - ・毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも4ヵ月間、毎日使用してください。
 - ・毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
 - ・効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。

す.

【この薬についてのお問い合わせ先は】

- ・症状, 使用方法, 副作用などのより詳しい質問がある場合は, 医師又は薬剤師にお尋ねください.
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください.

製造販売会社: 株式会社エムボックス

お客様相談室

電話: 03-6822-3723

受付時間: 平日9:00～17:00