

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名

ビーボ 痔用軟膏 〈外用痔疾用薬〉

第②類医薬品

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

内容量：20g MADE IN JAPAN

発売元/お客様相談室

株式会社エムボックス

東京都中央区八丁堀 2-3-9 H¹O 八丁堀 302

電話：03-6822-3723

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂 1169-142

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください。患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果 きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量 1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 肛門部にのみ使用してください。(3) 用法・用量を厳守してください。

成分・分量 (100g 中) プレドニゾン酢酸エステル... 0.1g、リドカイン... 3.0g、イソプロピルメチルフェノール... 0.1g、クロル

フェニラミンマレイン酸塩...0.2g、アラントイン...1.0g、グリチルレチン酸...0.3g、トコフェロール酢酸エステル...3.0g、L-メントール...0.1g 添加物：マクロゴール400、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリン
保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく早くご使用ください。

